


A microscopic image of mold, showing a dense network of white hyphae and numerous small, dark, spherical spores. The background is a soft, out-of-focus light purple. A dark purple rounded rectangle is overlaid on the right side of the image, containing white text.

ACTUALIZACIÓN
**TABLA DE ADITIVOS
ANTI-MICOTOXINAS
2022**

EMPRESA	PRODUCTO	COMPOSICIÓN	DOSIS	EFICACIA ESPECÍFICA SOBRE EL TIPO DE MICOTOXINA	INFORMACIÓN RELEVANTE
	Toxy-Nil®	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aluminosilicatos (bentonita 1m558) ✓ Extractos de levadura 	1-5 kg/t	Micotoxinas polares y no polares	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Producto de perfil básico para una protección standard
	Toxi-Nil Plus®	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aluminosilicatos (bentonita 1m558) ✓ Extractos de levadura ✓ Antioxidantes celulares ✓ Inmunoestimulantes 	0,5-2,5 kg/t		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Producto secuestrante de micotoxinas ✓ Proporciona un refuerzo inmunitario ✓ Evita la oxidación celular generada por los radicales libres de las micotoxinas
	Unike Plus®	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aluminosilicatos (bentonita 1m558) ✓ Extractos de levadura ✓ Antioxidantes celulares ✓ Inmunoestimulantes ✓ Protectores hepáticos y renales 	0,5-2,5 kg/t		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Producto de alta gama secuestrante de micotoxinas ✓ Proporciona protección de los órganos diana de las micotoxinas (hígado y riñón) ✓ Mejora el sistema inmunitario ✓ Evita la oxidación celular
	APSA QUITOX	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bentonita ✓ Sepiolita ✓ Kieselgur ✓ Levaduras ✓ Extracto vegetal 	<p>En líneas generales: adicionar junto con las materias primas en mezcladora a una dosis de 0,5-1 kg/t como preventivo y 2-5 kg/t en caso de problemática o directamente en el carro unifeed a dosis de 20 g/animal y día en rumiantes y 2 g/animal y día en pequeños rumiantes. Dosis específicas a definir según el nivel de riesgo de acuerdo a la metodología de evaluación del "Programa Adiveter".</p>	Alta ratio eficacia / coste para el control de micotoxicosis en procesos clínicos y subclínicos	<p>Línea de productos que aporta soluciones para un amplio espectro de micotoxinas (polares y apolares), formulaciones específicas desarrolladas a partir de principios activos cuidadosamente evaluados a nivel de consistencia y eficacia de adsorción.</p> <p>"Programa Adiveter": Detección y cuantificación de micotoxinas en materias primas y piensos. Sistema de verificación de eficacia mediante el análisis de biomarcadores (micotoxinas y metabolitos) en hígado y otras matrices.</p>
	APSA QUITOX PLUS	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bentonita ✓ Sepiolita ✓ MOS ✓ Ácido húmico 		Potente detoxificador intestinal por su amplio poder de adsorción de micotoxinas, así como otras toxinas y antígenos digestivos	
	APSA QUITOX BEEF	<ul style="list-style-type: none"> ✓ MOS ✓ Bentonita ✓ Kieselgur 		Óptima relación coste-eficacia formulado especialmente para animales de cebo	
	APSA QUITOX MILK	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kieselgur ✓ Bentonita 		Óptima relación coste eficacia para adsorber aflatoxinas e impedir su excreción en leche en forma de AFM1	
	Vitafix Select+	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bentonitas 	<p>Porcino & Avicultura 2 - 4 kg/t</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aflatoxinas 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Reducción de la biodisponibilidad de las micotoxinas mediante adsorción a bentonitas (con alto contenido de esmectita).
			<p>Vacuno: 50-100 g/animal/día Pequeños rumiantes: 6-12 g/animal/día</p>		
	Vitafix Plus+	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bentonitas 	<p>Porcino & Avicultura 2 - 4 kg/t</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aflatoxinas ✓ Zearalenona ✓ Fumonisinina ✓ DON 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Combinación de bentonitas con capacidad secuestrante de un amplio rango de micotoxinas, incluyendo Aflatoxinas, Fumonisinina, Zearalenona y DON
			<p>Vacuno: 20-100 g/animal/día Pequeños rumiantes: 5-15 g/animal/día</p>		
	Vitafix Ultra+	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bentonitas ✓ Polifenoles ✓ Betaína 	<p>Porcino & Avicultura 2 - 4 kg/t</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aflatoxinas ✓ Zearalenona ✓ Fumonisinina ✓ DON 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Combinación de bentonitas con capacidad secuestrante de un amplio rango de micotoxinas, incluyendo Aflatoxinas, Fumonisinina, Zearalenona y DON
			<p>Vacuno: 20-100 g/animal/día Pequeños rumiantes: 5-15 g/animal/día</p>		



EMPRESA	PRODUCTO	COMPOSICIÓN	DOSIS	EFICACIA ESPECÍFICA SOBRE EL TIPO DE MICOTOXINA	INFORMACIÓN RELEVANTE
	MYCOSORB A+	Glucanos extraídos de pared celular de especies seleccionadas de levaduras (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>) y de algas (<i>Chlorella vulgaris</i>) por un proceso patentado por Alltech Inc	0,5 - 1,5	Micotoxinas pertenecientes a los grupos: micotoxinas de Aspergillus, micotoxinas de Penicillium, zearalenonas, fumonisinas, tricotecenos tipo A y B, y toxinas de Ergot	 ver ficha
	MIC-OX COMPLET	Cliptilolita (1g568), Bentonita absorbente de Micotoxinas (1m558), Polifenoles. Paredes celulares ricas en MOS y Betagluconos. Betaina.	En bovinos, ovinos, caprinos, cerdos, aves y equinos: 1-3 kg/T de pienso (recomendado 2 kg/T).	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aflatoxina -B1 ✓ Zearalenona ✓ Fumonisina ✓ DON (Vomitoxina) ✓ T-2 ✓ HT-2 ✓ OTA(ocratoxina) 	<p>Actúa con gran poder absorbente-secuestrante. Bloquea los radicales por la alta actividad Redox. Potencia el sistema inmune intestinal. Actúa como antioxidante. Estimula la función hepática. Elimina los síntomas por intoxicación de Micotoxinas. Evitamos el empeoramiento de los resultados productivos y sanitarios del animal.</p>  ver ficha
 Distribuido por:  Advanced Animal Nutrition	ELITOX®	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adsorbentes especialmente seleccionados (Silicatos Aluminicos Sódico Cálcico Hidratados, HSCAS) ✓ Ingredientes naturales ✓ Vitamina C ✓ Propionato de calcio 	<p>Avicultura y porcino:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ bajo riesgo: 0,5-1 kg/t ✓ alto riesgo: 1-2 kg/t <p>Vacuno y equino:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ mantenimiento: 10-15grs/día ✓ alto riesgo : 25grs/día <p>Ovino y caprino:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ mantenimiento: 5grs/día ✓ alto riesgo : 10 grs/día <p>Acuicultura: 1-2 kg/t</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aflatoxinas ✓ Deoxynivalenol ✓ Toxina T-2 ✓ Toxina HT-2 ✓ Zearalenona ✓ Ocratoxina A ✓ Fumonisinias ✓ Roquefortina ✓ Ácido micofenólico ✓ Lolitrem B ✓ Ergovalina 	<p>Activo contra micotoxinas & endotoxinas.</p> <p>Eliminación de amplio espectro que une diferentes estrategias: ADSORCIÓN de micotoxinas polares por combinación de minerales: ALUMINOSILICATOS: Aglutina y elimina las micotoxinas. SOPORTE: a los mecanismos de defensa animal y ayuda a reducir los síntomas relacionados con las micotoxinas: BIOPOLÍMEROS + EXTRACTOS NATURALES + VITAMINA C: Actividad antibacteriana, antifúngica. Propiedades para curar heridas Efecto inmuno potenciador Características antioxidantes Supresión de la inflamación Testado en laboratorio independiente la ausencia de adsorción de otros nutrientes.</p>  ver ficha
 #ScienceHearted Distribuido por:  Feed Additives	BG-MAX Midds	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Basado en RFC™ (Refined Functional Carbohydrates™) extraído de células de levadura (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>) ✓ Aluminosilicatos (bentonita 1m558) 	<p>Bovino de leche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Vaca preparto: 56 g/animal/día ✓ Vaca en lactación: 28 g/animal/día ✓ Novilla 14 g/animal/día <p>Porcino:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cerda / Lechon 1era y 2da edad: 2 Kg/tonelada ✓ Cerdo de cebo: 1 Kg/tonelada <p>Ave:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gallina ponedora / Pollo de engorde / Pavo: 1 Kg/tonelada 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aflatoxina B1 ✓ Fumonisina ✓ Zearalenona ✓ Toxina T-2 ✓ Ocratoxina ✓ Deoxynivalenol (DON) 	<p>Combinación de las ventajas de RFC™ (Refined Functional Carbohydrates™) con una bentonita tratada específicamente para ayudar a mejorar sus propiedades de flujo.</p>  ver ficha

EMPRESA	PRODUCTO	COMPOSICIÓN	DOSIS	EFICACIA ESPECÍFICA SOBRE EL TIPO DE MICOTOXINA	INFORMACIÓN RELEVANTE
 <p>BASF We create chemistry</p>	Novasil™ Plus	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Arcilla natural con alto contenido de montmorillonita cálcica (1m558, EC 1060/2013) 	1 a 5 kg/t	Especialmente indicado contra aflatoxinas y fumonisinas	<p>Alta eficacia en la fijación de micotoxinas. Arcilla natural que fija específicamente las aflatoxinas de acuerdo con la normativa EC 1060/2013. Mantenimiento de la salud de los animales con una alimentación segura. Disponible en envases de 25 kg y 500 kg</p>
 <p>Biochem Feed Safety for Food Safety®</p>	B.I.O.Tox® Farm (Pienso complementario)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Atapulgita ✓ Derivado de levaduras ✓ Carbón vegetal ✓ Bentonita (1m558) ✓ Bentonita (1m558i) ✓ Sepiolita 	Todas las especies: 0,5 - 3,0 kg/t Vacuno: 10 - 60 g/animal/día	<ul style="list-style-type: none"> ✓ AFB1, AFB2, AFG1, AFG2 ✓ ZEA ✓ T-2 ✓ OTA ✓ FB1 ✓ Ergotamina 	<p>Biochem ha desarrollado una nueva gama de secuestrantes de micotoxinas, con una alta capacidad de adsorción de las micotoxinas que más afectan a la producción animal actual. B.I.O.Tox® Farm es una combinación de agentes adsorbente orgánicos e inorgánicos muy efectivos que:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Previene el efecto perjudicial de las micotoxinas polares y apolares. ✓ Previene la caída de los rendimientos productivos. ✓ Es un pienso complementario, puede administrarse a nivel de granja
	B.I.O.Tox® Z (Premezcla)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bentonita (1m558i) ✓ Sepiolita 	Todas las especies: 0,5 - 2,0 kg/t Vacuno: 10 - 40 g/animal/día	<ul style="list-style-type: none"> ✓ AFB1, AFB2, AFG1, AFG2 ✓ ZEA ✓ T-2 ✓ OTA ✓ FB1 ✓ Ergotamina 	<p>B.I.O.Tox® Z es una combinación de agentes adsorbentes de micotoxinas inorgánicos extremadamente purificados y con superficie modificada que:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Previene el efecto perjudicial de las micotoxinas polares y apolares. ✓ Previene la caída de los rendimientos productivos. ✓ Dosis de inclusión relativamente bajas.
	B.I.O. Tox® Activ8	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bentonita (1m558) ✓ Sepiolita (ES62) ✓ Extracto seco de uva de Vitis vinifera spp. vinifera (2b485) ✓ Semilla de cardo ✓ Carbón 	0,5 - 2,0 kg/t	<ul style="list-style-type: none"> ✓ AFB1, AFB2, AFG1, AFG2 ✓ ZEA ✓ T-2 ✓ OTA ✓ FB1 ✓ Ergotamina ✓ DON 	<p>El B.I.O. Tox® Activ8 es especialmente formulado con sustancias activas y desintoxicantes naturales para promover la salud, el desempeño y la función del hígado. Está científicamente comprobado la gran capacidad de sequestrar las micotoxinas con grand efecto sobre la Deoxynivalenol (DON). Para todas las especies.</p>



ver ficha



ver ficha

EMPRESA	PRODUCTO	COMPOSICIÓN	DOSIS	EFICACIA ESPECÍFICA SOBRE EL TIPO DE MICOTOXINA	INFORMACIÓN RELEVANTE
BIOMIN® Distribuido por: qualivet®	Mycofix® Plus 5.E	Sustancias para la reducción de las micotoxinas en pienso a Aflatoxina b1: 1m558 bentonita ✓ Deoxinivalenol (don): 1m01, cepa de microorganismos dsm 11798 de la familia coriobacteriaceae (biomin BBSH 797) ✓ Fumonisina, 1m03 Fumonisina	Dosis preventiva de 0,5 a 0,750 g/t de pienso. Dosis terapéutica de 1 a 2 kg/t de pienso. Uso en reproductoras, madres, lechones, cerdas adoptivas y verracos.	✓ Deoxinivalenol ✓ T-2 ✓ Zearalenona ✓ Fumonisina ✓ Ocratoxinas ✓ Aflatoxinas ✓ Ergot ✓ HT-2	✓ Producto con registro de uso en porcino ✓ Producto de perfil básico para una protección standard
	Mycofix® Select 5.E	✓ Agente antiapelmazante: kieselgur, e551c harina de algas	Dosis preventiva de 0,5 a 0,750 g/t de pienso. Dosis terapéutica de 1 a 2 kg/t de pienso. Uso indicado en cebo.		
	Mycofix Secure	✓ Sustancias para la reducción de las micotoxinas en pienso, aflatoxina b1: 1m558 bentonita ✓ Agente antiapelmazante: kieselgur, e551c ✓ Levaduras inactivadas ✓ Harina de algas	Dosis de 1 a 3 kg/t de pienso. Uso indicado en rumiantes.	✓ Aflatoxinas ✓ Fumonisina ✓ Ergot ✓ Ocratoxinas	✓ Producto secuestrante de micotoxinas ✓ Proporciona un refuerzo inmunitario ✓ Evita la oxidación celular generada por los radicales libres de las micotoxinas
Cargill™	NOTOX ULTIMATE PRO	✓ Carbón activo ✓ Extractos de fermentación de levadura ✓ Aluminosilicatos activados ✓ Extractos de plantas ✓ Antioxidantes celulares	Riesgo débil: Monogástricos 1 kg/t Rumiantes 20 g/animal/d Riesgo moderado: Monogástricos 2 kg/t Rumiantes 40 g/animal/d Riesgo elevado: Monogástricos 2,5 kg/t Rumiantes 50 g/animal/d	✓ Aflatoxina ✓ Fumonisina ✓ Ocratoxina ✓ Toxina T2 (T2) ✓ Zearalenona ✓ Deoxinivalenol (DON)	Ultimate Pro se basa en 4 pilares para disminuir las consecuencias de una contaminación por micotoxinas y sus efectos en los rendimientos productivos: ✓ Adsorción de micotoxinas ✓ Apoyo a función hepática ✓ Reducción del estrés oxidativo ✓ Inmunoestimulante
 dex feeding smart solutions	toxindex®	Mezcla de aluminosilicatos activados con tensoactivos y agentes destructores de micotoxinas.	De 1 a 3 kg/t de alimento , dependiendo del nivel de contaminación de micotoxinas	Amplio espectro de adsorción de micotoxinas: Aflatoxinas, Ochratoxina, T-2, Vomitoxina DON, Zearalenona, ... e incluso las que nos son desconocidas. Eficacia contrastada en experiencias "in vivo" e "in vitro".	Antimicotocídico de triple acción: ✓ Mecanismo de atrape físico. ✓ Mecanismo de atracción polar. ✓ Inhibición y destrucción.
	toxindex primus®	Precursos de glutatión, complejo de componentes orgánicos y minerales activados e inhibidores de micotoxinas.	Dosis habitual 0,5 a 1 kg/t	Amplio espectro de adsorción de micotoxinas: Aflatoxinas, Ochratoxina, T-2, Vomitoxina DON, Zearalenona, ... e incluso las que nos son desconocidas. Eficacia contrastada en experiencias "in vivo" e "in vitro".	Antimicotocídico de 5 acciones: ✓ Mecanismo de atrape físico. ✓ Mecanismo de atracción polar. ✓ Inhibición y destrucción. ✓ Acción metabólica antioxidante y desintoxicante. ✓ Estimulación inmunitaria.



ver ficha



ver ficha



ver ficha



ver ficha

EMPRESA	PRODUCTO	COMPOSICIÓN	DOSIS	EFICACIA ESPECÍFICA SOBRE EL TIPO DE MICOTOXINA	INFORMACIÓN RELEVANTE
 Distribuido por:  Biocidas Biodegradables ZIX	Detoxa Plus	Fermentos activos de <i>Saccharomyces Cerevisiae</i> y <i>Saccharomyces Telluris</i> .	0,5 a 1 kg por tonelada de alimento	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ocratoxinas ✓ Tricotecenos ✓ Deoxinivalenol ✓ Fumonisinias ✓ Zearalenona ✓ Aflatoxinas 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Destruir de las principales micotoxinas de importancia para la producción animal. ✓ Máxima eficacia en pH ácido (2,5). ✓ Elimina las micotoxinas en el estómago.
 EUROPEAN NATURAL ADDITIVES	ENADETOX	Premezcla de aditivos aromatizantes (2b) basada en el extracto de una planta, estandarizado por su contenido en ácidos cafeoilquinicos y flavonoides. Soporte: ✓ Tierra de diatomea	500-2000 g/Tm Aplicación en carro unifeed, de 5-20 g/ animal/ día.	Detoxificación del organismo mediante la eliminación de las toxinas a su paso por el hígado, incluyendo las micotoxinas.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se recomienda su uso en situaciones de desafío tóxico, incluyendo micotoxinas, metales pesados, restos de herbicidas o insecticidas. ✓ Igualmente se recomienda cuando se hayan detectado problemas de sobrecarga hepática, ya sea por malfuncionamiento hepático o por dietas excesivamente ricas en energía (hígado graso).
	ENADETOX PLUS	Premezcla de aditivos basada en: ✓ Filosilicatos ✓ Tectosilicatos ✓ Oligosacáridos ✓ Extractos de plantas y aceites esenciales	500-1500 g/Tm Aplicación en carro unifeed, de 5-20 g/ animal/ día.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ A dosis máxima reduce en más de un 90% la contaminación de materias primas por AFL B1. ✓ A dosis mínimas elimina sintomatología producida por todo tipo de micotoxicosis 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Combinación de productos con estructura multiespacial con alta porosidad y super cie de contacto. ✓ Permite eliminar las sustancias responsables del empeoramiento de índices productivos. ✓ Con efecto positivo sobre la mucosa intestinal. ✓ Consigue la eliminación de acúmulos de sustancias indeseables en órganos.
	ENADETOX Rumiantes	Premezcla de aditivos basada en: ✓ Bentonita (Montmorillonita, 1m558) ✓ Paredes de levaduras (MOS+βglucanos) ✓ Tierra de diatomeas purificada ✓ Extractos de plantas	10-20 g por vaca y día. 2,5-5 g por oveja y día.	Producto enfocado para ganado lechero, con el objetivo de reducir la aparición de aflatoxina M1 en leche. Captación de micotoxinas en el tracto digestivo, evitando su absorción. Detoxificación del organismo frente a toxinas (micotoxinas y sustancias indeseables) vía hígado.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Producto de uso en rumiantes. ✓ Previene la colonización del tracto intestinal por patógenos, estimula la actividad inmunológica de las células fagocíticas y potencia la acción de bacterias beneficiosas como <i>Lactobacillus</i> y <i>Bifidobacterium</i>. ✓ Posee una estructura multi espacial que le confiere alta porosidad y superficie de contacto.



ver ficha



ver ficha

EMPRESA	PRODUCTO	COMPOSICIÓN	DOSIS	EFICACIA ESPECÍFICA SOBRE EL TIPO DE MICOTOXINA	INFORMACIÓN RELEVANTE
 INGASO FARM Nutrición y Salud Animal	INGASO DETOXIN	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Selección de HASC (hidroxialuminosilicatos) con alta adsorción de compuestos tóxicos: ✓ Extracto de Cynara (CoE-565) ✓ Vitamina B12 ✓ Cloruro de colina Detoxificadores orgánicos de elevada porosidad: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Carbón termoestructurado ✓ Kieselgur (E-551c) 	Dosificación de mantenimiento: 1,5 kg/t de pienso. Dosificación habitual recomendada: 3 kg/t de pienso. Dosificación en casos de alta contaminación: 4,5 kg/t de pienso	Detoxificante de amplio espectro, eficaz frente a: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aflatoxinas ✓ DON ✓ Fumonisina ✓ Ocratoxina ✓ OTA ✓ Toxina T2 ✓ Zearalenona 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Extracto de Cynara: Productodetoxificador con efectohepatoprotector, colagogo ycolerético. ✓ Vitamina B12 y Cloruro de colina: Factores lipotrópicos esenciales. ✓ Antioxidante e inmunoestimulante. ✓ Amplio espectro de adsorción de micotoxinas. ✓ No altera la calidad nutritiva delpienso. ✓ Eficaz como tratamiento de choque en micotoxicosis agudas
 innovad CREATE TRUST	Escent® S	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mezcla de Aluminosilicatos ✓ Levaduras ✓ Antioxidantes ✓ Protectores hepáticos y renales 	Avicultura y porcino: 0.5 - 3 kg/T Rumiantes: 15 - 40 g/animal/día	Eficacia excelente demostrada <i>in vivo</i> para todas las micotoxinas principales: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Deoxivalenol ✓ Aflatoxinas ✓ Fumonisinias ✓ Zearalenona ✓ T-2 ✓ Ocratoxina A ✓ Ergot ✓ Emergentes 	<p><i>La combinación del servicio Myco-Marker® y la tecnología Escent® S conforman la plataforma RISE®. El servicio Myco-Marker® permite conocer por primera vez el impacto real de las micotoxinas en la salud y la productividad y optimizar la estrategia de mitigación con el detoxificante (Escent® S). Escent®S tiene multiple modos de accion todos ellos demostrados in vivo para apoyar a los animales a combatir el estrés:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Apoyo al hígado y riñones ✓ Prevención del estrés oxidativo ✓ Eleva la respuesta inmunológica ✓ Incrementa la detoxificación ✓ Adsorbe las (mico) toxinas
	Myco-Marker®	Herramienta de diagnóstico y biomonitoreo que permite conocer la exposición real de los animales a las micotoxinas y evaluar el impacto en la productividad y la salud.	<i>Análisis de pienso y sangre a partir de una sola gota (utilizando tarjeta FTA) sin limitaciones de transporte.</i>	<i>Determinación de 36 biomarcadores de micotoxinas claves para conocer el impacto real de las micotoxinas en los animales.</i>	



EMPRESA	PRODUCTO	COMPOSICIÓN	DOSIS	EFICACIA ESPECÍFICA SOBRE EL TIPO DE MICOTOXINA	INFORMACIÓN RELEVANTE
	TOXFIN™	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bentonita (1m558) ✓ Sepiolita (E562) 	Avicultura y porcino: 1-3 kg/t Rumiantes: 20-50 g/animal/día	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aflatoxina ✓ Fumonisina ✓ Ocratoxina ✓ Ergot 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Captador de micotoxinas de amplio espectro especialmente diseñado para unirse a éstas y promover su excreción via gastrointestinal. ✓ Herramienta válida para el control de las micotoxinas en rumiantes gracias al uso de una bentonita (1m558) que cumple con el reglamento europeo 1060/2013 como adsorbente de aflatoxina B, pero también gracias a la eficacia probada de captación de Ergot. ✓ Eficacia probada en ensayos in vitro e in vivo.
	TOXFIN™ XL	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bentonita (1m558) ✓ Sepiolita (E562) ✓ Bentonita (1m558i) 	Avicultura y porcino: 0,5 - 2,5kg/t Rumiantes: 20-50 g/animal/día	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aflatoxina ✓ Tricotecenos ✓ Zearalenona ✓ Fumonisina ✓ Ocratoxina ✓ Ergot 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Potente adsorbente de micotoxinas de amplio espectro especialmente diseñado para controlar, uniéndose a las micotoxinas y promoviendo su excreción via gastrointestinal. ✓ Incluye una bentonita (1m558) según normativa europea 1060/2013 como adsorbente de aflatoxina B, una sepiolita específica con una actividad demostrada vinculante a diversas micotoxinas; y una bentonita (1m558i), con una gran afinidad por Aflatoxinas, FB1, OTA, y especialmente por ZEA y T-2. ✓ Eficacia probada en ensayos in vitro e in vivo.
	TOXFIN™ R" CARE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bentonita (1m558) ✓ Sepiolita ✓ Bentonita (1m558i) ✓ Extractos de plantas ✓ Algas 	Avicultura y porcino: 1 - 3kg/t Rumiantes: 1 - 5 kg/t	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aflatoxina ✓ Tricotecenos ✓ Zearalenona ✓ Fumonisina ✓ Ocratoxina ✓ Ergot 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Potente protector con una estrategia conjunta. Incluye un adsorbente de amplio espectro especialmente diseñado para controlar, uniéndose a las micotoxinas y promoviendo su excreción via gastrointestinal. ✓ Recomendado en caso de alta contaminación con ocratoxina, fumoninsina, T-2 y zearalenona, o en caso de contaminación por DON en pavos, reproductoras, cerdas y lechones. ✓ Reduce los síntomas asociados con la micotoxicosis y fortalece el sistema de defensa natural del animal, protegiendo los órganos.
	Fintox Mold Plus	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Arcillas seleccionadas ✓ Ácidos orgánicos ✓ Levaduras y sus partes 	1-2 Kg/t de alimento en función del grado de contaminación.		Aditivo Anti-micotoxinas con efecto detoxificante y promotor de crecimiento. En Argentina, FINTOX MOLD PLUS es conocido como LIPTOMIC PLUS.
	Fintox Pro Advance	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Arcillas seleccionadas ✓ Levaduras y sus partes ✓ Fructooligosacáridos ✓ Extractos botánicos ✓ Betaína ✓ Antioxidante natural 	1-2 Kg/t de alimento en función del grado de contaminación.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ AFB1, AFB2, AFG1, AFG2, AFM1 ✓ ZEA ✓ T-2 ✓ OTA ✓ FB1 ✓ DON ✓ Citrinina ✓ Fumitoxina 	Adsorbente y detoxificante de amplio espectro eficaz frente a micotoxinas y otras endotoxinas con efecto depurativo y hepatoprotector.
	Fintox Pro Nature	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Levaduras y sus partes ✓ Algas marinas ✓ Fructooligosacáridos ✓ Extractos botánicos ✓ Betaína ✓ Antioxidantes naturales 	1-2 Kg/t de alimento en función del grado de contaminación.		Adsorbente y detoxificante de amplio espectro, libre de componentes minerales.



EMPRESA	PRODUCTO	COMPOSICIÓN	DOSIS	EFICACIA ESPECÍFICA SOBRE EL TIPO DE MICOTOXINA	INFORMACIÓN RELEVANTE
	MiaBond	Sustancias para la reducción de las micotoxinas en pienso: ✓ Bentonita (1m558)	Baja contaminación: 0,5 - 1 kg/t Alta contaminación: 1 - 3 kg/t Síntomatología aguda 4 - 5 kg/t Uso en rumiantes, aves de corral y cerdos.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ AFB1, AFB2, AFG1, AFG2 ✓ Zearalenona ✓ Ocratoxina ✓ Ergotamina 	<p>Adsorción.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ MiaBond se trata de un aditivo tecnológico basado en bentonita para la reducción en la contaminación del pienso por parte de aflatoxinas (Reg (EU) N° 1060/2013). ✓ MiaBond cumple con los estrictos requisitos dictados por el laboratorio de referencia de la unión europea en cuanto a la capacidad de captación de aflatoxinas (método EURL).
	MiaBond BP	Sustancias para la reducción de las micotoxinas en pienso: ✓ Bentonita (1m558) ✓ Polifenoles	Baja contaminación: 0,5 - 1 kg/t Alta contaminación: 1 - 3 kg/t Síntomatología aguda: 4 - 5 kg/t Uso en rumiantes, aves de corral y cerdos.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ AFB1, AFB2, AFG1, AFG2 ✓ Zearalenona ✓ Ocratoxina ✓ Ergotamina 	<p>Adsorción.</p> <p>Protección celular avanzada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ MiaBond BP adsorbe micotoxinas a su paso por todo el tracto gastrointestinal cumpliendo con los estrictos requisitos que dicta el laboratorio de referencia de la Unión Europea en cuanto a un captador de aflatoxinas (método EURL). * (Reg (EU) N° 1060/2013). ✓ MiaBond BP contiene polifenoles 100% definidos que protegen al animal frente a desequilibrios en el metabolismo causados por las micotoxinas.
	MiaBond 360	Sustancias para la reducción de las micotoxinas en pienso: ✓ Bentonita (1m558) ✓ Mezcla de Aromatizantes ✓ Coriobacteriaceae (1m03) ✓ Fumonisinesterase (1m01)	Baja contaminación: 1 - 2 kg/t Alta contaminación: 2 - 3 kg/t Síntomatología aguda: 4 - 5 kg/t Uso en aves de corral y cerdos.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ AFB1, AFB2, AFG1, AFG2 ✓ Zearalenona ✓ Ocratoxina ✓ Ergotamina ✓ DON ✓ T-2 ✓ Fumonisinina 	<p>Adsorción.</p> <p>Protección celular avanzada.</p> <p>Biotransformación.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ MiaBond 360 es un producto completo testado para proteger al animal frente a un gran número de micotoxinas. ✓ Incluye también ingredientes naturales para apoyar el sistema inmune y celular frente a los efectos nocivos de las micotoxinas.



	MOLBON SD	✓ Kieselgur E-551c alta pureza	0,5-5,0 kg/T Rumiantes 20-70 gr/animal/día	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adsorbente de micotoxinas de amplio espectro 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Producto para protección y prevención básica
	MOLBON SB	✓ Bentonita 1m558 alta pureza ✓ Sepiolita E563	0,5-2,5 kg/T Rumiantes 20-50 gr/animal/d		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Producto para protección y prevención básica
	MOLBON SF	✓ Kieselgur E-551c alta pureza ✓ Carbohidratos complejos inactivados	0,5-2 kg/T Rumiantes 20-50 gr/animal/d		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Alta adsorción y actividad de unión ✓ Inmunoestimulante
	MOLBON SC	✓ Kieselgur E-551c alta pureza ✓ Extractos vegetales	0,5-2 kg/T Rumiantes 20-50 gr/animal/d		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Alta capacidad de adsorción ✓ Hepatoprotector ✓ Hepatoestimulante ✓ Protector renal ✓ Antioxidante fisiológico
	MOLBON SFC	✓ Kieselgur E-551c alta pureza ✓ Carbohidratos Complejos inactivados ✓ Extractos vegetales	0,5-1,5 kg/T Rumiantes 20-40 gr/animal/d		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Alta adsorción y actividad de unión ✓ Hepatoprotector ✓ Hepatoestimulante ✓ Protector renal ✓ Antioxidante fisiológico ✓ Inmunoestimulante



EMPRESA	PRODUCTO	COMPOSICIÓN	DOSIS	EFICACIA ESPECÍFICA SOBRE EL TIPO DE MICOTOXINA	INFORMACIÓN RELEVANTE	
	Toxinor	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bentonita ✓ Sepiolita ✓ Tierras de Diatomeas 	1-5 kg/t	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Amplio espectro: activo frente a aflatoxinas, tricotecenos (toxina T-2), zearalenona, ocratoxinas y fumonisinas. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Combinación de tres componentes con distintas capacidades</i> ✓ <i>Cubrición de un amplio rango de actividad frente a distintas micotoxinas</i> 	 ver ficha
	Toxiwall	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bentonita ✓ Tierra de Diatomeas ✓ Paredes de levaduras 	0,5 -1 kg/t	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Activo frente a aflatoxinas, tricotecenos (toxina T-2), zearalenona, ocratoxinas y fumonisinas. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Gracias a la combinación de sus ingredientes es un potente secuestrante de micotoxinas para uso en alimentación animal</i> 	 ver ficha
	MT.X+	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Montmorillonita ✓ Montmorillonita intercalada ✓ Tierra de diatomeas ✓ Paredes celulares de levadura ✓ Extractos de algas 	Incorporar homogéneamente en la ración total, de 0,5 a 2,5 Kg/t de pienso , dependiendo de la contaminación Aplicación en fábrica de piensos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adsorbe micotoxinas complejas, como DON, FB1 y ZEA, así como micotoxinas más sencillas como AFB1 y OTA. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Protege eficazmente el sistema inmunitario de los animales frente a la agresión de micotoxinas, mejorando la salud de la granja, la rentabilidad y la reproducción.</i> ✓ <i>Solución completa con cuatro modos de actuación que trabajan de manera sinérgica.</i> ✓ <i>Presentación en polvo y semolilla</i> 	 ver ficha
	MMi.S	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Montmorillonita ✓ Montmorillonita intercalada ✓ Tierra de diatomeas ✓ Paredes celulares de levadura ✓ Extractos de algas 	Incorporar homogéneamente en la ración total, de 0,5 a 2,5 Kg/t de pienso, dependiendo de la contaminación Aplicación en granja y/o piensos en harina	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adsorbe micotoxinas complejas, como DON, FB1 y ZEA, así como micotoxinas más sencillas como AFB1 y OTA. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Los extractos de algas proporcionan protección para el epitelio intestinal y antioxidantes que ayudan al sistema inmunitario de los animales</i> 	 ver ficha
	MT.X AA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Montmorillonita micronizada ✓ Tierra de diatomeas ✓ Extractos de algas 	Incorporar homogéneamente en la ración total, de 0,5 a 2,5 Kg/t de pienso, dependiendo de la contaminación Aplicación en fábrica de piensos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Alta eficacia de adsorción de AFB1, ZEA y OTA y mitiga los efectos sobre el epitelio intestinal y sistema inmunitario de tricotecenos y fumonisinas 	 ver ficha	
	EXCENTIAL TOXIN PLUS	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mezcla de varios aluminosilicatos activados ✓ Extracto de paredes de levaduras ✓ Inhibidor fúngico ✓ Hepatoprotector 	<p>Monogástricos: 0,5 - 1,5 Kg/Tm (uso preventivo); 2 - 3 Kg/Tm (riesgo severo de micotoxicosis)</p> <p>Vacuno de Leche: 20 gr./animal/día (uso preventivo); 50 gr./animal/día (riesgo severo de micotoxicosis)</p> <p>Vacuno de Carne: 5 gr./animal/día (uso preventivo); 40 gr./animal/día (riesgo severo de micotoxicosis)</p> <p>Pequeños Rumiantes: 5 gr./animal/día (uso preventivo); 12,5 gr./animal/día (riesgo severo de micotoxicosis)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aflatoxinas (B1, B2, G1, G2) ✓ Enniatina B ✓ Zearalenona ✓ Fumonisinás (B1 y B2) ✓ Ocratoxina A ✓ Tricotecenos (DON, T2, HT2) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Diseñado para absorber y/o neutralizar las principales micotoxinas.</i> ✓ <i>Desarrollado conjuntamente con el Grupo MYTOX (www.mytox.be) y la Universidad de Gante.</i> ✓ <i>Datos comparativos en capacidad de captación con 30 captadores diferentes del mercado para un amplio grupo de micotoxinas a diferentes pH's.</i> 	 ver ficha
	Safwall	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 100% Pared celular de levadura <i>Saccharomyces cerevisiae</i> 	500gr -2000gr/t de pienso	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Zearalenona ✓ Ocratoxina ✓ Fumonisina 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Disminución de la concentración en plasma de ZEA hasta un 90% (pruebas in vivo) y de OTA en un 50% (pruebas in vivo). Mejora el impacto de la contaminación por Fumonisina en los órganos del animal.</i> 	 ver ficha

EMPRESA	PRODUCTO	COMPOSICIÓN	DOSIS	EFICACIA ESPECÍFICA SOBRE EL TIPO DE MICOTOXINA	INFORMACIÓN RELEVANTE
	Micoestop	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Componentes fitogénicos y fitolíticos, extractos vegetales y mezcla de aluminosilicatos 	Preventivo: 0,5-1 kg/t Curativo: 2-3 kg/t	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aflatoxinas ✓ Fumonisinias ✓ Zearalenona ✓ Ocratoxina ✓ Ergotamina 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Secuestrante y hepatoprotector.</i>
	SEPIFEED TOX 270	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mezcla de esmectitas y filosilicatos seleccionados 	Preventivo: 0,5-1 kg/t Riesgo Contaminación alta: 1,0 -3,0 kg/t RECOMENDADA: 2,0 kg/t	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aflatoxinas ✓ Fumonisinias ✓ Zearalenona ✓ Ocratoxinas ✓ T2 ✓ Ergotamina 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Alta eficacia frente a un amplio rango de micotoxinas polares y no polares.</i>
	TSX AM SD	<p>Ingredientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Carbonato de calcio ✓ Paredes celulares de levadura ✓ Extractos vegetales <p>Aditivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Vitamina E; (3a700): 5 000 UI ✓ Antioxidantes; E-321 BHT: 20 000 mg/kg ✓ Reductores de la contaminación de los piensos por micotoxinas; Aflatoxina B1: 1m558; Bentonita-Montmorillonita 200 000 mg/kg ✓ Antiaglomerantes: E-562 Sepiolita 50 000 mg/kg; 1m558i Bentonita 500 000 mg/kg ✓ Mezcla de sustancias aromáticas ✓ Vitamina B6 (3a831) 700 mg/kg 	De 1 a 5 kg/t En función del tipo, nivel de contaminación	<p>Contrastada tanto <i>in vivo</i> como <i>in vitro</i> para diferentes familias de micotoxinas: Aflatoxinas, tricotecenos (Vomitoxina, Toxina T-2, Monoacetoxicispermol, Diacetoxicispermol, Deoxinivalenol, Nivalenol), Zearalenona, Fumonisinias, Ocratoxina, Citrina, Patulina, Ácido Tenuazónico y ciclopiazónico</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Solución completa con cuatro modos de actuación que trabajan de manera sinérgica:</i> ✓ <i>Función de secuestro:</i> evaluada <i>in vivo</i> para luchar contra todas las familias de micotoxinas polares ✓ <i>Detoxificación:</i> Incrementa la producción de las enzimas hepáticas encargadas de la detoxificación de micotoxinas, punto clave que le permite ser eficaz independientemente del tipo de contaminación que se presente ✓ <i>Efecto antioxidante:</i> Protege de los radicales libres que se generan como consecuencia de los procesos de detoxificación y que generan estrés oxidativo sobre las células ✓ <i>Refuerzo inmunitario:</i> Para compensar la depresión inmune que se genera en todo tipo y nivel de contaminación por micotoxinas.
	TSX premium	<p>Ingredientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Carbonato de calcio ✓ Paredes celulares de levadura ✓ Extractos vegetales <p>Aditivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Vitamina E; (3a700): 15 000 UI ✓ Antioxidantes; E-321 BHT: 70 000 mg/kg ✓ Antiaglomerantes: E-562 Sepiolita 50 000 mg/kg; 1m558i Bentonita 500 000 mg/kg ✓ Mezcla de sustancias aromáticas ✓ Vitamina B6 (3a831) 6 000 mg/kg 	0.5 a 2 kg/t en función del tipo y nivel de contaminación		



ver ficha



ver ficha



ver ficha

EMPRESA	PRODUCTO	COMPOSICIÓN	DOSIS	EFICACIA ESPECÍFICA SOBRE EL TIPO DE MICOTOXINA	INFORMACIÓN RELEVANTE
	MICOTEC	Arcillas inorgánicas: ✓ Bentonita ✓ Sepiolita ✓ Clinoptilolita Tierra de diatomeas Sustancias hepatoprotectoras y inmunostimulantes	Dosificación de mantenimiento: 0,5 kg/t Dosificación habitual recomendada: 1,5 kg/t Dosificación en casos de alta contaminación: 2 kg/t	Adsorbente de micotoxinas de amplio espectro: ✓ Zearalenona ✓ Ocratoxina A ✓ Aflatoxina B1 ✓ Toxina T-2	<i>Mecanismo de doble acción:</i> ✓ ADSORCIÓN: Forma enlaces fuertes y eficaces con un amplio rango de micotoxinas, evitando su absorción y facilitando su excreción. ✓ BIOPROTECCIÓN: Contrarresta los efectos negativos de las micotoxinas en animales gracias a sus propiedades hepatoprotectoras, antioxidantes e inmunostimulantes.
	MICOTEC PLUS	✓ Selección de hidroxialuminosilicatos, protectores y activadores de la función hepática y biliar y detoxificadores orgánicos de elevada porosidad	Dosificación de mantenimiento: 1,5 kg/t Dosificación habitual recomendada: 3 kg/t Dosificación en casos de alta contaminación: 4,5 kg/t	Amplio espectro: ✓ Aflatoxinas ✓ DON ✓ Fumonisinias ✓ Ocratoxina ✓ OTA ✓ Toxina T-2 ✓ Zearalenona	<i>Producto completo que aporta sustancias con diferentes mecanismos de acción:</i> ✓ ADSORBENTE ✓ DETOXIFICANTE ✓ HEPATOPROTECTOR ✓ LIPOTRÓPICO
	MICOCID C	✓ Combinación específica de arcillas inorgánicas Kieselgur ✓ Semillas de cardo mariano	Preventivo: 0,5 kg/t Casos graves: 2,0 kg/t RECOMENDADA: 1,5 kg/t	Adsorbente de micotoxinas de amplio espectro: eficaz frente a las micotoxicosis habituales en producción animal	✓ <i>Indicado para todo tipo de animales.</i> ✓ <i>Acción frente a amplio rango de micotoxinas, proporcionando al mismo tiempo protección hepática</i>
	MICOCID +	✓ Carbón termoestructurado ✓ Tierra de diatomeas ✓ Vitamina B12 ✓ Extracto de cynara ✓ Colina	Preventivo: 1,5 kg/t Casos graves: 4,5 kg/t RECOMENDADA: 3,0 kg/t	Amplio espectro: Eficaz frente a micotoxinas polares y apolares	✓ <i>Alta capacidad de adsorción selectiva de micotoxinas, sin afectar la absorción de nutrientes en el intestino del animal.</i> ✓ <i>Ejerce un efecto hepatoprotector y lipotrópico</i>
	ATOX	Mezcla natural de esmectita magnésica con sepiolita de alta pureza	2 - 5 kg/t de pienso completo	✓ Aflatoxina ✓ Zearalenona	<i>Aditivo alimentario con eficacia probada frente a micotoxinas que además optimiza la tecnología de fabricación de las fórmulas, aportando ventajas nutricionales, mejorando la salud y bienestar de los animales.</i>
	ATOX PLUS	✓ Bentonita ✓ Lignosulfonato	Preventivo: 0,5 - 1 kg/t Casos de riesgo de micotoxicosis: 2 - 4 kg/t	✓ Aflatoxina ✓ Zearalenona ✓ Ocratoxina ✓ T2 ✓ Fumonisinias	<i>Premezcla alimentaria con fórmula especialmente diseñada para conseguir buena eficacia frente a un amplio rango de micotoxinas en animales de todas las especies y edades. La eficiencia de acción del producto está calculada teniendo en cuenta los datos de absorción y desorción.</i>
	ATOX NATURE SILVER	✓ Bentonita ✓ Sepiolita ✓ Carbon Activo	Preventivo: 0,5 - 1 kg/t Casos de riesgo de micotoxicosis: 2 - 4 kg/t	Secuestrante de amplio rango incluyendo Aflatoxina, Micotoxinas no polares (Zearalenona, Fumonisinias y Ocratoxina) y Tricotecenos (DON, T2, HT2 y DAS)	<i>Solución innovadora y patentada diseñada para combinar el modo de acción de tres secuestrantes distintos. La eficiencia de acción del producto está calculada teniendo en cuenta los datos de absorción y desorción. Proporciona una protección efectiva frente micotoxinas, mejorando la salud y rendimiento de los animales y al mismo tiempo mejorando la rentabilidad de la explotación.</i>



EMPRESA	PRODUCTO	COMPOSICIÓN	DOSIS	EFICACIA ESPECÍFICA SOBRE EL TIPO DE MICOTOXINA	INFORMACIÓN RELEVANTE
	TOXO MX	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Contiene bentonita con un alto contenido en esmectitas como agente secuestrante (1m558) 	0,5-2,5 kg/t de pienso completo	Especialmente indicado para contaminaciones por Aflatoxina B1	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cumple con el Reglamento (EU) No 1060/2013 como aditivo para la reducción del pienso por aflatoxina B1. ✓ Secuestrante de micotoxinas multiespecie.
	TOXO-O	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Contiene bentonitas, con un alto contenido de esmectitas como agente secuestrante(1m558) lo cual le hace cumplir con el Reglamento (EU) No 1060/2013 como aditivo para la reducción de la contaminación del pienso por aflatoxina B1. ✓ Contiene también fracciones de paredes celulares inactivadas de una cepa de levadura de <i>Saccharomyces cerevisiae</i>. 	0,5-2,5 kg/t de pienso completo	Secuestrante de micotoxinas de amplio espectro (especialmente aflatoxinas y zearalenona)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cumple con el Reglamento (EU) No 1060/2013 como aditivo para la reducción del pienso por aflatoxina B1. ✓ Secuestrante de micotoxinas multiespecie. ✓ Apoyo a la integridad de la pared intestinal.
	TOXO XL	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Contiene bentonitas, con un alto contenido en esmectitas como agente secuestrante (1m558) lo cual le hace cumplir con el Reglamento (EU) No 1060/2013 como aditivo para la reducción de la contaminación del pienso por aflatoxina B1. ✓ Contiene también fracciones de paredes celulares inactivadas de una cepa de levadura de <i>Saccharomyces cerevisiae</i> rica en B-1,3/1,6-glucanos activados (biopolisacáridos de glucosa). 	0,5-2,5 kg/t pienso completo	Secuestrante de micotoxinas de amplio espectro. Aflatoxinas, Zearalenona, T2, Ocratoxina, Fumoni-sina, DON	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cumple con el Reglamento (EU) No 1060/2013 como aditivo para la reducción del pienso por aflatoxina B1. ✓ Secuestrante de micotoxinas multiespecie. ✓ Apoyo a la integridad de la pared intestinal. ✓ Apoyo a el sistema inmunológico no específico.
	TOXO XXL	<ul style="list-style-type: none"> ✓ TOXO-XXL contiene bentonita con un alto contenido en esmectitas como agente secuestrante (1m558), cumpliendo así con el Reglamento (EU) No 1060/2013 como aditivo para la reducción de la contaminación del pienso por Aflatoxina B1, y fracciones de pared celular de levaduras inactivas de una cepa de <i>Saccharomyces cerevisiae</i> rica en β-1,3/1,6-glucanos activados (biopolisacáridos de glucosa). TOXO-XXL contiene también vitaminas y antioxidantes adicionales. 	<p>Para todas las especies de aves y porcino</p> <p>Añadir TOXO-XXL a dosis de 0,5-2,5 kg por ton de pienso completo.</p>	<p>Ayuda a mantener o mejorar el rendimiento de los animales en los casos (o sospecha) de piensos contaminados por múltiples micotoxinas.</p> <p>Acción frente a un amplio espectro de micotoxinas (Aflatoxina, Zea, T2, Ocratoxina, Fum, DON, HT2) y alcaloides ergotamínicos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cumple con el Reglamento (EU) No 1060/2013 como aditivo para la reducción de la contaminación del pienso por aflatoxina B1. ✓ Apoyo a la integridad de la pared intestinal. ✓ Apoyo a el sistema inmunológico no específico. ✓ Apoyo a la neutralización de radicales libres. ✓ Adecuado tanto para climas cálidos así como para climas frescos y moderados donde los hongos <i>fusarium</i> son más frecuentes.



ver ficha