



TABLA DE ADITIVOS **ANTI-MICOTOXINAS Y ANTI-ENDOTOXINAS**

Actualización 2026

nutriNews
.com



TABLA DE ADITIVOS **ANTI-MICOTOXINAS**

nutriNews
.com

TABLA DE ANTI-MICOTOXINAS



EMPRESA	PRODUCTO	COMPOSICIÓN	DOSIS	EFICACIA ESPECÍFICA SOBRE EL TIPO DE MICOTOXINA	INFORMACIÓN RELEVANTE
 Producto de:  #ScienceHearted	BG-MAX Midds	Basado en RFC™ (Refined Functional Carbohydrates™) extraído de células de levadura (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>) Aluminosilicatos (bentonita 1m558)	Bovino de leche: Vaca preparto: 56 g/animal/día Vaca en lactación: 28 g/animal/día Novilla: 14 g/animal/día Porcino: Cerda / Lechón 1ª y 2ª edad: 2 kg/t Cerdo de cebo: 1 kg/t Ave: Gallina ponedora / Pollo de engorde / Pavo: 1 kg/t	Aflatoxina B1 Fumonisina Zearalenona Toxina T-2 Ocratoxina Deoxinivalenol (DON)	Combinación de las ventajas de RFC™ (Refined Functional Carbohydrates™) con una bentonita tratada específicamente para ayudar a mejorar sus propiedades de flujo.



	Adidetox	Bentonita Sepiolita Kieselgur Levaduras Extracto vegetal	En líneas generales: adicionar junto con las materias primas en mezcladora a una dosis de 0,5-1 kg/t como preventivo y 2-3 kg/t en caso de problemática o directamente en el carro unifeed a dosis de 20 g/animal y día en rumiantes y 2 g/animal y día en pequeños rumiantes. Dosis específicas a definir según el nivel de riesgo de acuerdo a la metodología de evaluación del "Programa Adiveter".	Óptima relación coste-eficacia para el control de micotoxicosis en procesos clínicos y subclínicos.	Línea de productos que aporta soluciones para un amplio espectro de micotoxinas (polares y no polares), formulaciones específicas desarrolladas a partir de principios activos cuidadosamente evaluados a nivel de consistencia y eficacia de adsorción. "Programa Adiveter": detección y cuantificación de micotoxinas en materias primas y piensos. Sistema de verificación de eficacia mediante el análisis de biomarcadores de exposición en matrices biológicas.
	Adidetox Plus	Bentonita Sepiolita MOS Ácido húmico		Potente detoxificador intestinal por su amplio poder de adsorción de micotoxinas, así como otras toxinas y antígenos digestivos.	
	Adidetox Protect	Bentonita Kieselgur MOS Ácido húmico Betaína Extracto alcachofa Silimarina		Combina el poder secuestrante de sustancias adsorbentes de micotoxinas con el poder protector de sustancias naturales (antioxidantes, hepatoprotectoras, detoxificantes).	
	Adidetox Beef	Bentonita Kieselgur MOS		Óptima relación coste-eficacia formulado especialmente para animales de cebo.	
	Adidetox Milk	Bentonita Kieselgur		Óptima relación coste-eficacia para adsorber aflatoxinas e impedir su excreción en leche en forma de AFM1.	



TABLA DE ANTI-MICOTOXINAS



EMPRESA	PRODUCTO	COMPOSICIÓN	DOSIS	EFICACIA ESPECÍFICA SOBRE EL TIPO DE MICOTOXINA	INFORMACIÓN RELEVANTE
	T5X AM SD	Paredes celulares de levadura, vitaminas, oligoelementos, antioxidantes, antiaglomerantes y mezcla de sustancias aromáticas	Monogástricos: Especies más sensibles de 3 a 5 kg/t dependiendo del tipo y nivel de contaminación. Especies menos sensibles de 1 a 4 kg/t dependiendo del tipo y nivel de contaminación. Rumiantes: De 15 a 75 g/animal y día dependiendo del tipo, nivel de contaminación e incidencias en granja.	Contrastada tanto <i>in vivo</i> como <i>in vitro</i> para diferentes familias de micotoxinas: Aflatoxinas, tricotecenos (Vomitoxina, Toxina T-2, Monoacetoxiscpernol, Diacetoxiscpernol, Deoxinivalenol, Nivalenol), Zearalenona, Fumonisina, Ocratoxina, Citrina, Patulina, Ácido Tenuazónico y ciclopiazónico.	Solución completa con cuatro modos de actuación que trabajan de manera sinérgica: Función de secuestro: Evaluada <i>in vivo</i> para luchar contra todas las familias de micotoxinas polares. Detoxificación: Incrementa la producción de las enzimas hepáticas encargadas de la detoxificación de micotoxinas, punto clave que le permite ser eficaz independientemente del tipo de contaminación que se presente. Efecto antioxidante: Protege de los radicales libres que se generan como consecuencia de los procesos de detoxificación y que generan estrés oxidativo sobre las células. Refuerzo inmunitario: Para compensar la depresión inmune que se genera en todo tipo y nivel de contaminación por micotoxinas.
	T5X premium	Paredes celulares de levadura, extractos de semilla de uva, vitaminas, oligoelementos, antioxidantes, antiaglomerantes y mezcla de sustancias aromáticas	Monogástricos: De 0,5 a 2 kg/t dependiendo del tipo y nivel de contaminación. Rumiantes: De 15 a 30 g/animal y día dependiendo del tipo, nivel de contaminación e incidencias en granja.		



ver ficha

TABLA DE ANTI-MICOTOXINAS



EMPRESA	PRODUCTO	COMPOSICIÓN	DOSIS	EFICACIA ESPECÍFICA SOBRE EL TIPO DE MICOTOXINA	INFORMACIÓN RELEVANTE
	Vitafix Select+	Contiene bentonitas, con un alto contenido en esmectitas como agente secuestrante (1m558)	Porcino y avicultura: 2-4 kg/t Vacuno: 50-100 g/animal/día Pequeños rumiantes: 6-12 g/animal/día	Aflatoxinas	Reducción de la biodisponibilidad de las micotoxinas mediante adsorción a bentonitas (con alto contenido de esmectita).
	Vitafix Plus+	Contiene bentonitas y bentonitas modificadas, con un alto contenido en esmectitas como agente secuestrante (1m558)	Porcino y avicultura: 2-4 kg/t Vacuno: 20-100 g/animal/día Pequeños rumiantes: 5-15 g/animal/día	Aflatoxinas Zearalenona Fumonisina DON Ocratoxina T2, HT2 Micotoxinas emergentes Eficacia demostrada contra endotoxinas de bacterias gram negativas	Combinación de bentonitas con capacidad secuestrante de un amplio rango de micotoxinas. Efecto probado tanto <i>in vitro</i> como <i>in vivo</i> sobre órganos diana.
	Vitafix Ultra+	Bontiene bentonitas y bentonitas modificadas, con un alto contenido en esmectitas como agente secuestrante (1m558). Polifenoles naturales y betaína			Combinación de bentonitas con capacidad secuestrante de un amplio rango de micotoxinas. Efecto probado tanto <i>in vitro</i> como <i>in vivo</i> sobre órganos diana. Contiene polifenoles naturales para combatir el estrés oxidativo y bioprotectores.
	Vitafix Spectrum	Contiene bentonitas y bentonitas modificadas, con un alto contenido en esmectitas como agente secuestrante (1m558)	Porcino y avicultura: 1-3 kg/t Vacuno: 20-60 g/animal/día Pequeños rumiantes: 4-8 g/animal/día		Combinación de bentonitas con capacidad secuestrante de un amplio rango de micotoxinas. Efecto probado tanto <i>in vitro</i> como <i>in vivo</i> sobre órganos diana.
	Vitafix Protect	Contiene bentonitas y bentonitas modificadas, con un alto contenido en esmectitas como agente secuestrante (1m558). Polifenoles naturales y paredes de levaduras			Combinación de bentonitas con capacidad secuestrante de un amplio rango de micotoxinas. Efecto probado tanto <i>in vitro</i> como <i>in vivo</i> sobre órganos diana. Los ingredientes funcionales que incorpora tienen efecto antiinflamatorio y antioxidante



ver ficha

TABLA DE ANTI-MICOTOXINAS



EMPRESA	PRODUCTO	COMPOSICIÓN	DOSIS	EFICACIA ESPECÍFICA SOBRE EL TIPO DE MICOTOXINA	INFORMACIÓN RELEVANTE
	MYCOSORB® EVO	Glucanos extraídos de pared celular de especies seleccionadas de levaduras (<i>Saccaromyces cerevisiae</i>) por un proceso patentado por Alltech Inc. Estructuras microbianas especializadas en la adsorción de DON y Ácido Fusárico. Aditivos tecnológicos, reductores de la contaminación de los piensos por micotoxinas: aflatoxina B1 (1m558 - Bentonita 150 000 mg/kg).	0,5 kg/t – 1,5 kg/t	Micotoxinas pertenecientes a los grupos: micotoxinas de <i>Aspergillus</i> , ocratoxinas, zearalenonas, fumonisinas, tricotecenos tipo A y B, ácido fusárico, micotoxinas emergentes y toxinas de Ergot	Acción frente a un amplio espectro de micotoxinas. Baja dosificación, no se satura. Rápida acción. No secuestra vitaminas ni minerales. Respaldado por una amplia investigación científica. Producto de elección en monogástricos y rumiantes.
	MYCOSORB® A+ EVO	Glucanos extraídos de pared celular de especies seleccionadas de levaduras (<i>Saccaromyces cerevisiae</i>) y de algas (<i>Chlorella vulgaris</i>) por un proceso patentado por Alltech Inc. Estructuras microbianas especializadas en la adsorción de DON y Ácido Fusárico. Aditivos tecnológicos, reductores de la contaminación de los piensos por micotoxinas: aflatoxina B1 (1m558 - Bentonita 150 000 mg/kg).		Micotoxinas pertenecientes a los grupos: micotoxinas de <i>Aspergillus</i> , micotoxinas de <i>Penicillium</i> , ocratoxinas, zearalenonas, fumonisinas, tricotecenos tipo A y B, ácido fusárico, micotoxinas emergentes y toxinas de Ergot	Acción frente a un amplio espectro de micotoxinas Baja dosificación, no se satura Rápida acción No secuestra vitaminas ni minerales Respaldado por una amplia investigación científica Producto de elección en vacuno, ovino y caprino de leche
	MTB EVO	Glucanos extraídos de pared celular de especies seleccionadas de levaduras (<i>Saccaromyces cerevisiae</i>) y de algas (<i>Chlorella vulgaris</i>) por un proceso patentado por Alltech Inc. Estructuras microbianas especializadas en la adsorción de DON y Ácido Fusárico.		Micotoxinas pertenecientes a los grupos: micotoxinas de <i>Aspergillus</i> , ocratoxinas, zearalenonas, fumonisinas, tricotecenos tipo A y B, ácido fusárico, micotoxinas emergentes y toxinas de Ergot	Acción frente a un amplio espectro de micotoxinas. Baja dosificación, no se satura. Rápida acción. No secuestra vitaminas ni minerales. Compatible con el uso de cualquier antibiótico o aditivo. Respaldado por una amplia investigación científica Producto de elección en mascotas y caballos.



TABLA DE ANTI-MICOTOXINAS



EMPRESA PRODUCTO COMPOSICIÓN DOSIS EFICACIA ESPECÍFICA SOBRE EL TIPO DE MICOTOXINA INFORMACIÓN RELEVANTE



	B.I.O.Tox® / B.I.O.Tox® Farm	Bentonita (1m558) Bentonita (1m558i) Sepiolita Paredes de levaduras (TechnoMos®) Carbón vegetal	0,5 - 3,0 kg/t (dependiendo del nivel de contaminación)	Aflatoxinas Fumonisinás Ocratoxinas Toxina T-2 Ergotamina Zearalenona	B.I.O.Tox® y B.I.O.Tox® Farm son una combinación de agentes adsorbentes orgánicos e inorgánicos muy efectivos que: Previene el efecto perjudicial de las micotoxinas polares y apolares. Previene la pérdida de rendimiento productivo. Puede administrarse en pienso (B.I.O.Tox®) o en granja (B.I.O.Tox® Farm).
	B.I.O.Tox® Z	Bentonita (1m558) Sepiolita	0,5 - 2,0 kg/t (dependiendo del nivel de contaminación)	Aflatoxinas Zearalenona Fumonisinás Ocratoxinas Toxina T-2 Ergotamina	B.I.O.Tox® Z ha sido especialmente desarrollado con sustancias activas para prevenir el efecto de las micotoxinas, sobre todo de la zearalenona.
	B.I.O. Tox® Activ8	Bentonita (1m558) Sepiolita Extracto seco de uva Semilla de cardo mariano Carbón vegetal	0,5 - 2,0 kg/t (dependiendo del nivel de contaminación)	Deoxinivalenol Zearalenona Aflatoxinas Fumonisinás Ocratoxinas Toxina T-2 Ergotamina	B.I.O.Tox® Activ8 formulado con sustancias activas y desintoxicantes naturales para promover la salud, el rendimiento y la función hepática. Está científicamente comprobada su gran capacidad de secuestrar las micotoxinas, especialmente la vomitoxina (DON).
	MyBind	Bentonita (1m558) Sepiolita Paredes de levaduras (TechnoMos®)	0,5 - 2,0 kg/t (dependiendo del nivel de contaminación)	Aflatoxinas Fumonisinás Ocratoxinas Toxina T-2 Ergotamina Zearalenona	MyBind ofrece una alternativa eficaz y de amplio espectro de adsorción para la producción ecológica.



TABLA DE ANTI-MICOTOXINAS



EMPRESA	PRODUCTO	COMPOSICIÓN	DOSIS	EFICACIA ESPECÍFICA SOBRE EL TIPO DE MICOTOXINA	INFORMACIÓN RELEVANTE	
	NOTOX ULTIMATE PRO	Carbón activo Extractos de fermentación de levadura Aluminosilicatos activados Extractos de plantas Antioxidantes naturales	Riesgo débil: Monogástricos 1 kg/t Rumiantes 20 g/animal/d Riesgo moderado: Monogástricos 2 kg/t Rumiantes 40 g/animal/d Riesgo elevado: Monogástricos 2,5 kg/t Rumiantes 50 g/animal/d	Aflatoxina Fumonisina Ocratoxina Toxina T2 (T2) Zearalenona Deoxinivalenol (DON)	Ultimate Pro se basa en 4 pilares para disminuir las consecuencias de una contaminación por micotoxinas y sus efectos en los rendimientos productivos: Adsorción de micotoxinas. Apoyo a función hepática. Reducción del estrés oxidativo. Estimula la respuesta inmunitaria.	 ver ficha
	toxindex [®]	Mezcla de aluminosilicatos activados con tensoactivos y agentes destructores de micotoxinas	De 1 a 3 kg/t de alimento, dependiendo del nivel de contaminación de micotoxinas	Amplio espectro de adsorción de micotoxinas: Aflatoxinas, Ochratoxina, T-2, Vomitoxina DON, Zearalenona, ... e incluso las que nos son desconocidas. Eficacia contrastada en experiencias "in vivo" e "in vitro".	Antimicotocíclico de triple acción: Mecanismo de atrape físico. Mecanismo de atracción polar. Inhibición y destrucción.	 ver ficha
	toxindex primus [®]	Precursores de glutatión, complejo de componentes orgánicos y minerales activados e inhibidores de micotoxinas	Dosis habitual 0,5 a 1 kg/t	Amplio espectro de adsorción de micotoxinas: Aflatoxinas, Ochratoxina, T-2, Vomitoxina DON, Zearalenona, ... e incluso las que nos son desconocidas. Eficacia contrastada en experiencias "in vivo" e "in vitro".	Antimicotocíclico de 5 acciones: Mecanismo de atrape físico. Mecanismo de atracción polar. Inhibición y destrucción. Acción metabólica antioxidante y desintoxicante. Estimulación inmunitaria.	 ver ficha
	Multinat SP	Multinat SP asocia una combinación única de 4 sustancias, seleccionadas y dosificadas según el saber hacer de Jefo	Cerdos/Aves de corral: 0,5-3,5 kg/t de pienso Bovinos: 30 a 50 g/cabeza/día Pequeños rumiantes: 5 a 8 g/cabeza/día Jefo ha desarrollado una herramienta de cálculo de dosis según el contexto. Contáctenos para más detalles.	Micotoxinas tradicionales y micotoxinas emergentes	Multinat SP es la nueva generación de soluciones desarrolladas por Jefo. Está enfocado en la adsorción de micotoxinas, incluidas las micotoxinas emergentes, y ayuda al animal a protegerse de sus efectos nocivos.	 ver ficha

TABLA DE ANTI-MICOTOXINAS



KEMIN

 ver ficha

EMPRESA	PRODUCTO	COMPOSICIÓN	DOSIS	EFICACIA ESPECÍFICA SOBRE EL TIPO DE MICOTOXINA	INFORMACIÓN RELEVANTE
	Toxfin®	Bentonita (1m558) Sepiolita (ES62)	Avicultura y porcino: 1-3 kg/t Rumiantes: 20-50 g/animal/día	Aflatoxina Fumonisin Ocratoxina Ergot	Captador de micotoxinas de amplio espectro especialmente diseñado para unirse a éstas y promover su excreción vía gastrointestinal. Herramienta válida para el control de las micotoxinas en rumiantes gracias al uso de una bentonita (1m558) que cumple con el reglamento europeo 1060/2013 como adsorbente de aflatoxina B, pero también gracias a la eficacia probada de captación de ergot. Eficacia probada en ensayos <i>in vitro</i> e <i>in vivo</i> .
	Toxfin® XL	Bentonita (1m558) Sepiolita (ES62) Bentonita (1m558i)	Avicultura y porcino: 0,5 - 2,5 kg/t Rumiantes: 20-50 g/animal/día	Aflatoxina Tricotecenos Zearalenona Fumonisin Ocratoxina Ergot	Potente adsorbente de micotoxinas de amplio espectro especialmente diseñado para controlar, uniéndose a las micotoxinas y promoviendo su excreción vía gastrointestinal. Incluye una bentonita (1m558) según normativa europea 1060/2013 como adsorbente de aflatoxina B, una sepiolita específica con una actividad demostrada vinculante a diversas micotoxinas; y una bentonita (1m558i), con una gran afinidad por aflatoxinas, FB1, OTA, y especialmente por ZEA y T-2. Eficacia probada en ensayos <i>in vitro</i> e <i>in vivo</i> .
	Toxfin® Care	Bentonita (1m558) Sepiolita Bentonita (1m558i) Extractos de plantas Algas	Avicultura y porcino: 1 - 3 kg/t Rumiantes: 1 - 5 kg/t	Aflatoxina Tricotecenos Zearalenona Fumonisin Ocratoxina Ergot	Potente protector con una estrategia conjunta. Incluye un adsorbente de amplio espectro especialmente diseñado para controlar, uniéndose a las micotoxinas y promoviendo su excreción vía gastrointestinal. Recomendado en caso de alta contaminación con ocratoxina, fumonisin, T-2 y zearalenona, o en caso de contaminación por DON en pavos, reproductoras, cerdas y lechones. Reduce los síntomas asociados con la micotoxicosis y fortalece el sistema de defensa natural del animal, protegiendo los órganos.

TABLA DE ANTI-MICOTOXINAS



EMPRESA	PRODUCTO	COMPOSICIÓN	DOSIS	EFICACIA ESPECÍFICA SOBRE EL TIPO DE MICOTOXINA	INFORMACIÓN RELEVANTE
	Fintox Mold Plus	Arcillas seleccionadas Ácidos orgánicos Levaduras y sus partes	1-2 kg/t de alimento en función del grado de contaminación.	AFB1, AFB2, AFG1, AFG2, AFM1 ZEA T-2 OTA FB1 DON Citrinina Fumitoxina	Aditivo Anti-micotoxinas con efecto detoxificante y mejorador de resultados zootécnicos.
	Fintox Pro Advance	Arcillas seleccionadas Levaduras y sus partes Fructooligosacáridos Extractos botánicos Betaína Antioxidante natural	1-2 kg/t de alimento en función del grado de contaminación.		Adsorbente y detoxificante de amplio espectro eficaz frente a micotoxinas y otras endotoxinas con efecto depurativo. Puede actuar como agente hepatoprotector.
	Fintox Pro Nature	Levaduras y sus partes Algas marinas Fructooligosacáridos Extractos botánicos Betaína Antioxidantes naturales	1-2 kg/t de alimento en función del grado de contaminación.		Adsorbente y detoxificante de amplio espectro, libre de componentes minerales.

TABLA DE ANTI-MICOTOXINAS



EMPRESA	PRODUCTO	COMPOSICIÓN	DOSIS	EFICACIA ESPECÍFICA SOBRE EL TIPO DE MICOTOXINA	INFORMACIÓN RELEVANTE
	MiaBond	Bentonita (1m558)	0,5-5 kg/t dependiendo del nivel de contaminación.	AFB1, AFB2, AFG1, AFG2 Zearalenona Ocratoxina Ergotamina Endotoxinas	Adsorción. MiaBond se trata de un aditivo tecnológico basado en bentonita para la reducción en la contaminación del pienso por parte de aflatoxinas (Reg (EU) N° 1060/2013). MiaBond cumple con los estrictos requisitos dictados por el laboratorio de referencia de la unión europea en cuanto a la capacidad de captación de aflatoxinas (método EURL).
	MiaBond BP	Bentonita (1m558) Polifenoles naturales que combaten el estrés oxidativo	0,5-5 kg/t dependiendo del nivel de contaminación.	AFB1, AFB2, AFG1, AFG2 Zearalenona Ocratoxina Ergotamina Endotoxinas	Adsorción. MiaBond se trata de un aditivo tecnológico basado en bentonita para la reducción en la contaminación del pienso por parte de aflatoxinas (Reg (EU) N° 1060/2013). MiaBond cumple con los estrictos requisitos dictados por el laboratorio de referencia de la unión europea en cuanto a la capacidad de captación de aflatoxinas (método EURL).
	MiaBond 360	Bentonita (1m558) Coriobacteriacea (1m01) Fumonisina esterasa (1m03i) Mezcla de compuestos aromatizantes	1-3 kg/t dependiendo del nivel de contaminación.	AFB1, AFB2, AFG1, AFG2 Zearalenona Ocratoxina Ergotamina DON T-2 Fumonisina Endotoxinas	Inactivación de toxinas = adsorción + biotransformación + biodegradación Protección celular = mezcla de compuestos aromatizantes Equilibrio del TGI = combinación de inactivación de toxinas e ingredientes naturales
	MiaBond Drink	Fumonisin esterasa (1m03i) para biodegradación de FUM, mezcla de ingredientes naturales, mezcla de probióticos y prebióticos, fuentes de energía.	100-200 g / 1.000 litros de agua de bebida	Fumonisina B1 y B2	Biodegradación de fumonisinas, modulación del sistema inmunitario, potenciador del sistema digestivo, fuente de energía, cualidades rehidratantes, eubióticos.
	MiaBond Aqua	Bentonita (1m558i) y dinoptilolita, mezcla de compuestos aromatizantes funcionales, elementos traza orgánicos, mezcla de prebióticos.	Peces y camarones: 0,5-3 kg/t dependiendo del nivel de contaminación.	Aflatoxinas B1, B2, G1 y G2, Zearalelona, Ocratoxina, Ergotamina	Captación de toxinas, modulador del sistema inmunitario, protección celular, reducción de amoniaco.



TABLA DE ANTI-MICOTOXINAS



EMPRESA	PRODUCTO	COMPOSICIÓN	DOSIS	EFICACIA ESPECÍFICA SOBRE EL TIPO DE MICOTOXINA	INFORMACIÓN RELEVANTE
	Toxinor	Bentonita Sepiolita Tierras de Diatomeas	1-5 kg/t	Amplio espectro: activo frente a aflatoxinas, tricotecenos (toxina T-2), zearalenona, ocratoxinas y fumonisinas.	Combinación de tres componentes con distintas capacidades. Cubrición de un amplio rango de actividad frente a distintas micotoxinas.
	Toxiwall	Bentonita Tierra de Diatomeas Paredes de levaduras	0,5 -1 kg/t	Activo frente a aflatoxinas, tricotecenos (toxina T-2), zearalenona, ocratoxinas y fumonisinas.	Gracias a la combinación de sus ingredientes es un potente secuestrante de micotoxinas para uso en alimentación animal.
	MT.X+	Montmorillonita Tecnología Algoclay Tierra de diatomeas Paredes celulares de levadura Extractos de algas	Incorporar homogéneamente en la ración total, de 0,5 kg/t a 2,5 kg/t de pienso, dependiendo de la contaminación. Aplicación en fábrica de piensos.	Adsorbe micotoxinas complejas, como DON, FB1 y ZEA, así como micotoxinas más sencillas como AFB1 y OTA.	Protege eficazmente el sistema inmunitario de los animales frente a la agresión de micotoxinas, mejorando la salud de la granja, la rentabilidad y la reproducción.
	MMi.S	Montmorillonita Tecnología Algoclay Tierra de diatomeas Paredes celulares de levadura Extractos de algas	Incorporar homogéneamente en la ración total, de 0,5 kg/t a 2,5 kg/t de pienso, dependiendo de la contaminación. Aplicación en granja y/o piensos en harina.	Adsorbe micotoxinas complejas, como DON, FB1 y ZEA, así como micotoxinas más sencillas como AFB1 y OTA.	Solución completa con cuatro modos de actuación que trabajan de manera sinérgica. Presentación en polvo y semolilla.
	MT.X AA	Montmorillonita micronizada Tierra de diatomeas Extractos de algas	Incorporar homogéneamente en la ración total, de 0,5 kg/t a 2,5 kg/t de pienso, dependiendo de la contaminación. Aplicación en fábrica de piensos.	Alta eficacia de adsorción de AFB1, ZEA y OTA y mitiga los efectos sobre el epitelio intestinal y sistema inmunitario de tricotecenos y fumonisinas.	Los extractos de algas proporcionan protección para el epitelio intestinal y antioxidantes que ayudan al sistema inmunitario de los animales.



TABLA DE ANTI-MICOTOXINAS



EMPRESA	PRODUCTO	COMPOSICIÓN	DOSIS	EFICACIA ESPECÍFICA SOBRE EL TIPO DE MICOTOXINA	INFORMACIÓN RELEVANTE
	EXCENTIAL TOXIN PLUS	Mezcla de varios aluminosilicatos activados Extracto de paredes de levaduras Inhibidor fúngico Hepatoprotector y favorecedor de la integridad intestinal	Entre 0,5 y 3 Kg/t en monogástricos* Entre 20 y 50 gramos/animal día en rumiantes* *Según nivel de contaminación por micotoxinas	Aflatoxinas (B1, B2, G1, G2) Enniatina B Zearalenona Fumonisin (B1 y B2) Ocratoxina A Tricotecenos (DON, T2, HT2) Alternariol Beauvericina Esterigmatocistina	Diseñado para captar o neutralizar el mayor rango de micotoxinas conocidas a diferentes pH's. Es una solución de amplio espectro al ser un tratamiento combinado para la gestión de micotoxicosis para todas las especies. Mejora la salud y los rendimientos productivos de animales con micotoxicosis. Sirve de "seguro" para el uso de posibles ingredientes contaminados con micotoxinas. El producto no sólo es altamente eficaz adsorbiendo micotoxinas, sino también minimizando los efectos negativos producidos por las micotoxinas en diversos órganos como el hígado y el intestino.
	Safwall	100% Pared celular de levadura <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	500gr -2000 gr/t de pienso	Zearalenona Ocratoxina Fumonisin	Disminución de la concentración en plasma de ZEA hasta un 90% (pruebas <i>in vivo</i>) y de OTA en un 50% (pruebas <i>in vivo</i>). Mejora el impacto de la contaminación por Fumonisin en los órganos del animal.



TABLA DE ANTI-MICOTOXINAS



EMPRESA	PRODUCTO	COMPOSICIÓN	DOSIS	EFICACIA ESPECÍFICA SOBRE EL TIPO DE MICOTOXINA	INFORMACIÓN RELEVANTE
qualivet® Productos de:  dsm-firmenich	Mycofix® Plus 5.E	Sustancias para la reducción de la contaminación por micotoxinas en el alimento de los animales: 1m01 Cepa del microorganismo DSM 11798 de la familia Coriobacteriaceae (Biomín® BBSH 797) 1m03i Esterasa de Fumonisina EC 3.1.1.87 1m558 bentonita Levaduras inactivadas Harina de algas Mezcla de sustancias aromatizantes E551c Kieselgur	Dosis recomendada: Preventiva: 0,5-0,75 kg/t de pienso. En caso de contaminación elevada con micotoxinas: 1-2 kg/t de pienso.	DON, T-2, HT-2 Zearalenona Fumonisina Ocratoxina Aflatoxina Ergot Alcaloides de pirrolizidina	1. Producto diferenciado: única empresa con 3 autorizaciones de la UE en el grupo de aditivos de piensos para desactivación de micotoxinas. 2. Protección absoluta contra las micotoxinas: a. Biotransformación: Combinación única de enzimas específicas patentadas y componentes biológicos que convierte las micotoxinas en metabolitos no tóxicos. Ventajas de la biotransformación. Específica. Irreversible. Solución para las micotoxinas no-adsorbibles. b. Adsorción: Contiene bentonita autorizada por la UE que adsorbe más del 90% de aflatoxinas cumpliendo los estrictos requisitos establecidos por el laboratorio de referencia del UE (EURL). Protección única contra endotoxinas: uniones específicas e irreversibles. Adsorbe ocratoxinas y alcaloides de ergot. c. Bioprotección: Protege y da soporte al hígado y sistema inmune. Fortalece la barrera intestinal y uniones estrechas de los efectos negativos de las micotoxinas y endotoxinas.
	Mycofix® Select 5.E			DON, T-2, HT-2 Fumonisina Ocratoxina Aflatoxina Ergot Alcaloides de pirrolizidina	
	Mycofix® Secure	Sustancias para la reducción de la contaminación por micotoxinas en el alimento de los animales: 1m558 bentonita	Dosis recomendada: 1-3 kg/t de pienso.	Aflatoxina Ergot Ocratoxina Fumonisina Alcaloides de pirrolizidina	



TABLA DE ANTI-MICOTOXINAS



EMPRESA	PRODUCTO	COMPOSICIÓN	DOSIS	EFICACIA ESPECÍFICA SOBRE EL TIPO DE MICOTOXINA	INFORMACIÓN RELEVANTE
	SEPIFEED TOX 270	Mezcla de esmectitas y filosilicatos seleccionados	Preventivo: 0,5-1 kg/t Riesgo Contaminación alta: 1,0 -3,0 kg/t RECOMENDADA: 2,0 kg/t	Aflatoxinas Fumonisin Zearalenona Ocratoxinas T2 Ergotamina	Alta eficacia frente a un amplio rango de micotoxinas polares y no polares.
	ATOX	Mezcla natural de esmectita magnésica con sepiolita de alta pureza	2 - 5 kg/t de pienso completo	Aflatoxina Zearalenona	Aditivo alimentario con eficacia probada frente a micotoxinas que además optimiza la tecnología de fabricación de las fórmulas, aportando ventajas nutricionales, mejorando la salud y bienestar de los animales.
	ATOX PLUS	Bentonita Lignosulfonato	Preventivo: 0,5 - 1 kg/t Casos de riesgo de micotoxicosis: 2 - 4 kg/t	Aflatoxina Zearalenona Ocratoxina T2 Fumonisin	Premezcla alimentaria con fórmula especialmente diseñada para conseguir buena eficacia frente a un amplio rango de micotoxinas en animales de todas las especies y edades. La eficiencia de acción del producto está calculada teniendo en cuenta los datos de absorción y desorción.
	ATOX NATURE SILVER	Bentonita Sepiolita Carbon Activo	Preventivo: 0,5 - 1 kg/t Casos de riesgo de micotoxicosis: 2 - 4 kg/t	Secuestrante de amplio rango incluyendo Aflatoxina, Micotoxinas no polares (Zearalenona, Fumonisin y Ocratoxina) y Tricotecenos (DON, T2, HT2 y DAS)	Solución innovadora y patentada diseñada para combinar el modo de acción de tres secuestrantes distintos. La eficiencia de acción del producto está calculada teniendo en cuenta los datos de absorción y desorción. Proporciona una protección efectiva frente micotoxinas, mejorando la salud y rendimiento de los animales y al mismo tiempo mejorando la rentabilidad de la explotación.



TABLA DE ANTI-MICOTOXINAS



EMPRESA	PRODUCTO	COMPOSICIÓN	DOSIS	EFICACIA ESPECÍFICA SOBRE EL TIPO DE MICOTOXINA	INFORMACIÓN RELEVANTE
	TOXO MX	Contiene bentonita con un alto contenido en esmectitas como agente secuestrante (1m558)	1,0-2,0 kg/t de pienso completo	Especialmente indicado para contaminaciones por Aflatoxina B1	Cumple con el Reglamento (EU) No 1060/2013 como aditivo para la reducción del pienso por aflatoxina B1. Secuestrante de micotoxinas multiespecie.
	TOXO-O	Contiene bentonitas, con un alto contenido de esmectitas como agente secuestrante (1m558) lo cual le hace cumplir con el Reglamento (EU) No 1060/2013 como aditivo para la reducción de la contaminación del pienso por aflatoxina B1. Contiene también fracciones de paredes celulares inactivadas de una cepa de levadura de <i>Saccharomyces cerevisiae</i> .	0,5-2,0 kg/t de pienso completo	Secuestrante de micotoxinas de amplio espectro (especialmente aflatoxinas y zearalenona)	Cumple con el Reglamento (EU) No 1060/2013 como aditivo para la reducción del pienso por aflatoxina B1. Secuestrante de micotoxinas multiespecie. Apoyo a la integridad de la pared intestinal.
	TOXO XL	Contiene bentonitas, con un alto contenido en esmectitas como agente secuestrante (1m558) lo cual le hace cumplir con el Reglamento (EU) No 1060/2013 como aditivo para la reducción de la contaminación del pienso por aflatoxina B1. Contiene también fracciones de paredes celulares inactivadas de una cepa de levadura de <i>Saccharomyces cerevisiae</i> rica en B-1,3/1,6-glucanos activados (biopolisacáridos de glucosa).	0,5-2,0 kg/t pienso completo	Secuestrante de micotoxinas de amplio espectro. Aflatoxinas, Zearalenona, T2, Ocratoxina, Fumonisina, DON	Cumple con el Reglamento (EU) No 1060/2013 como aditivo para la reducción del pienso por aflatoxina B1. Secuestrante de micotoxinas multiespecie. Apoyo a la integridad de la pared intestinal. Apoyo al sistema inmunológico no específico.



TABLA DE ANTI-MICOTOXINAS



EMPRESA	PRODUCTO	COMPOSICIÓN	DOSIS	EFICACIA ESPECÍFICA SOBRE EL TIPO DE MICOTOXINA	INFORMACIÓN RELEVANTE
 VILOFOSS	MYCOSAFE CORE	Bentonita (1m558)	Animales monogástricos: 1-3 kg MycoSaf[®] Core por tonelada de pienso Rumiantes: 20-45 g por animal y día	Enfocado en los desafíos relacionados con las aflatoxinas Alta funcionalidad basada en esmectita Funciona de forma fiable en distintos rangos de pH Uso objetivo: todas las especies	Protección esencial
	MYCOSAFE PLUS	Paredes celulares de levadura Bentonita (1m558) Carbón vegetal Antioxidantes Extractos vegetales	Animales monogástricos: 0,5-2,0 kg MycoSaf[®] Plus por tonelada de pienso Rumiantes: 10-30 g por animal y día	Soporte multicapa, incluye componentes orgánicos Para desafíos basados en cereales / DON-T-2 Favorece la función hepática y el equilibrio oxidativo Ideal para porcino y avicultura, pero apto para todas las especies.	Soporte reforzado para alimentación basada en cereales
	MYCOSAFE ALGAE	Paredes celulares de levadura Bentonita (1m558) Carbón vegetal Antioxidantes Extractos vegetales Algas	Animales monogástricos: 0,5-2,0 kg MycoSaf[®] Algae por tonelada de pienso Rumiantes: 10-30 g por animal y día	Mayor contenido orgánico Optimizado para Penicillium y otros riesgos relacionados con el almacenamiento Favorece la competencia inmunitaria y la función hepática Especialmente útil en dietas de rumiantes	Soporte ampliado frente a desafíos relacionados con forrajes y almacenamiento





TABLA DE ADITIVOS **ANTI-ENDOTOXINAS**

nutriNews
.com

TABLA DE ANTI-ENDOTOXINAS



EMPRESA	PRODUCTO	COMPOSICIÓN	DOSIS	EFICACIA ESPECÍFICA SOBRE EL TIPO DE MICOTOXINA	INFORMACIÓN RELEVANTE
	Adidetox Plus	Ácido húmico MOS Bentonita Sepiolita	En líneas generales: adicionar junto con las materias primas en mezcladora a una dosis de 0,5-1 kg/t como preventivo y 2-5 kg/t en caso de problemática o directamente en el carro unifeed a dosis de 20 g/animal y día en rumiantes y 2 g/animal y día en pequeños rumiantes. Dosis específicas a definir según el nivel de riesgo de acuerdo a la metodología de evaluación del "Programa Adiveter".	Hepatoprotector y adsorbente de micotoxinas de amplio espectro. Protege la barrera intestinal frente a bacterias con fimbrias tipo I (<i>E. coli</i> , <i>Salmonella</i> y enterobacterias)	Además de ser un potente adsorbente de micotoxinas y de tóxicos y antígenos intestinales, el ácido húmico tiene propiedades antivirales, antibacterianas y antiinflamatorias.
	Vitafix Plus+	Contiene bentonitas y bentonitas modificadas, con un alto contenido en esmectitas como agente secuestrante (1m558)	Porcino y avicultura: 2-4 kg/t Vacuno: 20-100 g/animal/día Pequeños rumiantes: 5-15 g/animal/día	Eficacia demostrada contra endotoxinas de bacterias Gram negativas	El control de endotoxinas bacterianas evita la acción inflamatoria de las mismas, mejorando la barrera gastrointestinal. Todo ello permite aumentar la biodisponibilidad de los nutrientes de la dieta. Demostrado en pruebas <i>in vitro</i> e <i>in vivo</i> .
	Vitafix Ultra+	Contiene bentonitas y bentonitas modificadas, con un alto contenido en esmectitas como agente secuestrante (1m558). Polifenoles naturales y betaina			
	Vitafix Spectrum	Contiene bentonitas y bentonitas modificadas, con un alto contenido en esmectitas como agente secuestrante (1m558)	Porcino y avicultura: 1-3 kg/t Vacuno: 20-60 g/animal/día Pequeños rumiantes: 4-8 g/animal/día	Eficacia demostrada contra endotoxinas de bacterias Gram negativas	El control de endotoxinas bacterianas evita la acción inflamatoria de las mismas, mejorando la barrera gastrointestinal. Todo ello permite aumentar la biodisponibilidad de los nutrientes de la dieta. Demostrado en pruebas <i>in vitro</i> e <i>in vivo</i> .
	Vitafix Protect	Contiene bentonitas y bentonitas modificadas, con un alto contenido en esmectitas como agente secuestrante (1m558). Polifenoles naturales y paredes de levaduras			
	B.I.O.Tox® Activ8	Bentonita (1m558) Sepiolita Extracto seco de uva Semilla de cardo mariano Carbón vegetal	0,5 - 2,0 kg/t (Dependiendo del nivel de contaminación)	Deoxinivalenol Zearalenona Aflatoxinas Fumonisinás Ocratoxinas Toxina T-2 Ergotamina	El control de las endotoxinas requiere un enfoque global que prevenga la producción de un exceso de endotoxinas y su absorción a nivel intestinal. B.I.O.Tox® Activ8 formulado con sustancias activas y desintoxicantes naturales para promover la salud, el rendimiento, la función hepática y la protección de la integridad intestinal del daño causado por algunas sustancias perjudiciales puede ayudar a prevenir el daño generado por las endotoxinas.

