



TABLA DE **PREBIÓTICOS, PROBIÓTICOS & OTROS**

Actualización 2026

TABLA DE PREBIÓTICOS & OTROS



EMPRESA/
FABRICANTE

NOMBRE
COMERCIAL

INGREDIENTE/S

CONCENTRACIÓN (UFC/G PROD.)

ESPECIE DE DESTINO

DOSIS DE USO

INFORMACIÓN ADICIONAL

PAISES EN
DISTRIBUCIÓN EN
LATINOAMÉRICA

NOVUS

NOVUS	ACTIVATE® DA Aditivo Eubiótico	Ácido fumárico, ácido benzoico, DL-metionina hidroxianálogo de calcio	Combinación sinérgica de ácidos orgánicos y HMBTa (precursor de metionina)	Aves y Cerdos	3kg a 5kg por tonelada de alimento terminado	Combinación sinérgica de ácidos orgánicos y fuente de metionina altamente disponible para adicionar al alimento balanceado y promover la integridad intestinal.	Consulte la disponibilidad con uno de nuestros técnicos: info@novusint.com
	ACTIVATE® WD MAX Aditivo Nutricional Acidificante	Ácido fórmico, ácido propiónico, DL-metionina hidroxianálogo	Metionina hidroxianálogo, ácido fórmico y ácido propiónico	Aves y Cerdos	0.5 a 1.0 ml/L	Acidificante orgánico para mezclarse con el agua de bebida de los animales.	
	AVIMATRIX® Aditivo Eubiótico	Ácido benzoico, formiato de calcio, ácido fumárico	Ácido benzoico, formiato de calcio, ácido fumárico y excipientes	Pollos de engorda, gallinas ponedoras y pavos	0.5kg por tonelada de alimento terminado	Aditivo acidificante para mejorar la eficiencia alimenticia. Para la elaboración de alimento para pollos de engorde, gallinas ponedoras y pavos en todas sus etapas productivas.	
	PROVENIA® Aditivo Eubiótico	Ácido benzoico, ácido fumárico, formiato de calcio	Ácido benzoico, formiato de calcio, ácido fumárico y excipientes	Cerdos en todas las etapas productivas	Añadir al alimento hasta 0.5% según indicación: • Lechones hasta 0.25% • Cerdas hasta 0.3% • Cerdos de engorde hasta 0.5%	Aditivo acidificante granular, auxiliar en el incremento digestivo de los piensos para cerdos en todas las etapas productivas.	
	NEXT ENHANCE® 150 Aditivo Eubiótico	Timol y Carvacrol	Timol, carvacrol y excipientes	Aves, Cerdos y Bovinos	15g a 60g por tonelada de alimento terminado	Aromatizante, mejorador de la apetencia y palatabilidad del pienso.	



ver ficha

TABLA DE PREBIÓTICOS & OTROS



EMPRESA/
FABRICANTE

NOMBRE
COMERCIAL

INGREDIENTE/S

COMPOSICIÓN PREBIÓTICA

ESPECIE DE DESTINO

DOSIS DE USO

INFORMACIÓN ADICIONAL

PAISES EN
DISTRIBUCIÓN EN
LATINOAMÉRICA



GOLF

Manan oligosacáridos (MOS), betaglucanos,
galactoligosacáridos, fructoligosacáridos,
levadura y minerales orgánicos

Indicado para todas las especies

Aves (pollos de engorde - preiniciador e
iniciador) 1,0 - 2,0kg/t; Aves (pollos de engorde-
crecimiento y terminación)
0,5 - 1,0kg/t; Aves (ponedoras - preiniciador
e iniciador) 1,0 - 2,0kg/t; Aves (ponedoras
otras fases) 0,5 - 1,0kg/t; Cerdos (preiniciador,
iniciador y reproducción) 3,0kg/t; Cerdos
(crecimiento y terminación) 1,0 - 2,0kg/t;
Bovinos 1,5 - 2,5kg/t; Ovejas y cabras
1,5 - 2,5kg/t; Equinos 1,5 - 2,5kg/ ton;
Peces 1,0 - 3,0kg/t; Camarones
1,0 - 2,0kg/t; Perros y gatos (crías)
1,0 - 3,0kg/t; Perros y gatos (adultos)
1,0 - 2,0kg/t.

GOLF es una mezcla de prebióticos naturales, de tecnología
exclusiva de Olmix, especialmente desarrollada para
aumentar las poblaciones de bacterias benéficas
decenas de veces (principalmente *Lactobacillus*
y *Bifidobacterias*) y para reducir la población de
microorganismos patógenos, como *Salmonella*, *E. coli*,
Clostridium, y otros patógenos oportunistas por la sinergia
de sus componentes (FOS, GOS, MOS y Beta-glucanos),
que actúan modulando la microbiota intestinal y, en
consecuencia, favorecen la salud intestinal y sistémica
del animal.

EFFECTO BIFIDOGÉNICO:

Los prebióticos FOS y GOS son fibras solubles fermentables,
que, por no ser digeridas por las enzimas digestivas del
animal, alcanzan el intestino grueso, en donde sirven de
sustratos para las bacterias beneficiosas, aumentando
la síntesis de ácidos grasos de cadena corta (acético,
propiónico y butírico) y bacteriocinas.

SALUD INTESTINAL:

Con el aumento de la población de bacterias beneficiosas,
el crecimiento de microorganismos patógenos es inhibido
por diferentes medios de acción, siendo estos, exclusión
competitiva, acidificación del ambiente intestinal, acción
directa de las bacteriocinas y de los ácidos grasos. La
reducción de enteritis y la acidificación del pH intestinal
favorecen la acción de las enzimas digestivas resultando
en la mejora de la absorción de los nutrientes de la dieta,
incluyendo minerales como calcio y magnesio

INMUNOMODULACIÓN:

Los 1,3 y 1,6 betaglucanos son inmunomoduladores,
que estimulan la actividad de las células del sistema
inmunitario.

AGLUTINACIÓN FÍSICA DE BACTERIAS DAÑINAS: MOS es un
poderoso aglutinador de bacterias que posee fimbrias del
tipo I, como las *Salmonella* y *E. coli*.

La sinergia entre sus principios activos convierte a
GOLF en una mezcla prebiótica con una alta capacidad
para modular la microbiota de los animales con efecto
inmunomodulador eficaz, aumentando el rendimiento
productivo y mejorando el estado de salud de los animales.

Sudamérica



ver ficha

TABLA DE PREBIÓTICOS & OTROS



EMPRESA/ FABRICANTE	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE/S	COMPOSICIÓN PREBIÓTICA	ESPECIE DE DESTINO	DOSIS DE USO	INFORMACIÓN ADICIONAL	PAISES EN DISTRIBUCIÓN EN LATINOAMÉRICA
	GLUCAN MOS		Betaglucanos y mananligosacáridos de las levaduras <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Indicado para todas las especies	Aves (preiniciador e iniciador) 1,5 - 2,5kg/t; Aves (crecimiento y terminación) 0,5 - 1,5kg/t; Cerdos (preiniciador, iniciador, reproducción) 2,0kg/t; Cerdos (crecimiento y terminación) 0,5 - 1,5kg/t; Bovinos 1,0 - 2,0kg/t o 20g/animal/día; Ovejas y cabras 1,0 - 2,0kg/t o 20g/animal/día; Equinos 1,0 - 2,0kg/t o 20g/animal/día; Peces 1,0 - 3,0kg/t; Camarones 1,0 - 3,0kg/t; Perros y gatos (adultos) 1,0 - 3,0kg/t.	INMUNOMODULACION: Los 1,3 y 1,6 β-glucanos son inmunomoduladores, que estimulan la actividad de las células del sistema inmunitario. Aumenta la concentración de anticuerpos en el suero y en la mucosa intestinal, la síntesis de antimicrobianos naturales (peróxido de hidrógeno y óxido nítrico) y la resistencia al estrés (cortisol). AGLUTINACIÓN FÍSICA DE BACTERIAS DAÑINAS: MOS es un poderoso aglutinador de bacterias que posee fimbrias del tipo I, como las <i>Salmonella</i> y <i>E. coli</i>, contribuyendo al equilibrio de la microbiota intestinal. El efecto secundario de la modulación de la microbiota y la inmunomodulación intestinal se refleja en una mayor salud sistémica del animal. Se puede utilizar como sinérgico, sustituto o rotacional a los APC's.	Sudamérica

TABLA DE PREBIÓTICOS & OTROS



EMPRESA/
FABRICANTE

NOMBRE
COMERCIAL

INGREDIENTE/S

COMPOSICIÓN PREBIÓTICA

ESPECIE DE DESTINO

DOSIS DE USO

INFORMACIÓN ADICIONAL

PAISES EN
DISTRIBUCIÓN EN
LATINOAMÉRICA



BIOWALL

Betaglucanos y mananoligosacáridos (MOS) de las levaduras *Saccharomyces cerevisiae*

Agregar a la ración de los animales según la recomendación del responsable técnico.

BioWall es una fracción premium de la pared celular de levadura, rica en polisacáridos bioactivos como β -glucanos (1,3/1,6) y manano-oligosacáridos (MOS), que actúa como una barrera biológica natural, protegiendo a los animales contra patógenos intestinales y micotoxinas, a la vez que refuerza la integridad intestinal y la resistencia inmunitaria.

- Adsorbe y reduce la biodisponibilidad de micotoxinas como la Zearalenona (ZEA) y la Ocratoxina (OTA).
- Previene la adhesión de patógenos intestinales como Salmonella y *E. coli*, mediante la aglutinación promovida por los MOS.
- Estimula la respuesta inmunitaria.
- Promueve el equilibrio de la microbiota intestinal gracias a su efecto prebiótico natural.

Sudamérica

BIOHYDRO

Levadura *Saccharomyces cerevisiae*

Indicado para todas las especies

Aves - Pollo de engorde: 1,0 – 2,0 kg;
Cerdos - Lechones – en reemplazo a plasma 2,0 – 5,0%;
Cerdos - Otras fases – en reemplazo a plasma 1,0 – 2,0%
Cerdos - Como aditivo 2,0 – 5,0 kg;
Bovinos - Terneros 5 – 10g/cabeza/día;
Bovinos - Ganado lechero – pre y post parto 10 – 20g/cabeza/día;
Peces y camarones - 0,5 – 4,0%
Perros y gatos - 0,5 – 4,0%

- Compuestos de bajo peso molecular. Mediante hidrólisis enzimática cuidadosamente controlada, las proteínas se transforman en péptidos, aminoácidos y nucleótidos libres de bajo peso molecular y alta biodisponibilidad, lo que garantiza una alta digestibilidad y una mejor absorción de nutrientes.
- Favorece la salud intestinal y la inmunidad: Rico en β -glucanos y MOS que modulan la inmunidad y equilibran la microbiota.
 - Estimula el desarrollo y la adaptación: Ideal para animales jóvenes, ancianos o estresados (destete, transporte, recuperación de la salud) donde el uso eficiente de la energía y los nutrientes es esencial.
 - Potenciador natural del sabor: Aumenta la palatabilidad y reduce el rechazo del alimento.

TABLA DE PREBIÓTICOS & OTROS



EMPRESA/ FABRICANTE	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE/S	ESPECIE DE DESTINO	DOSIS DE USO	INFORMACIÓN ADICIONAL	PAISES EN DISTRIBUCIÓN EN LATINOAMÉRICA
------------------------	---------------------	---------------	--------------------	--------------	-----------------------	---



Promitec	Prefib	Fructooligosacaridos y Maltooligosacaridos	Indicado para Pollos de engorde, gallinas ponedoras y reproductoras, cerdos (engorde, cerdas de cría y reproductores), crustáceos y peces de aguas frías y cálidas, perros y gatos de todas las edades y razas.	Pollos de engorde, gallinas ponedoras y reproductoras: 700-1200 g /Ton de alimento. Lechones, cerdos en precebo, ceba, engorde y finalización: 700-1200 g/Ton alimento. Cerdas de cría, gestación y lactancia y reproductores: 700-1200 g/Ton alimento. Perros y gatos: 700-1200 g/Ton alimento. Peces de aguas frías y cálidas: 700 a 1.500 g/Ton alimento. Crustáceos (camarón, langostino y langosta), en etapas de alevino, juvenil, adulto y reproducción: 700 a 1.500 g/Ton alimento.	Mezcla de carbohidratos funcionales a base de fructooligosacaridos de cadena corta y maltooligosacaridos generados a partir de procesos biotecnológicos de transformación enzimática que sirven como sustrato selectivo para microorganismos benéficos intestinales lo que permite modular las comunidades microbianas aumentando la producción de ácidos grasos de cadena corta y promoviendo un ambiente óptimo en el intestino, adicionalmente, esta mezcla específica de carbohidratos funcionales brinda un efecto modulador de la inflamación y la respuesta inmune lo que ayuda a mantener una salud intestinal adecuada.	Colombia y Republica Dominicana
	Fingrow Inicio	Fructooligosacaridos, Aceite esencial de <i>Lippia origanoides</i>	Indicado para Pollos de engorde, gallinas ponedoras y reproductoras, cerdos (engorde, cerdas de cría y reproductores), crustáceos y peces de aguas frías y cálidas.	Pollos de engorde: 450 g/Ton alimento en etapas de preinicio e iniciación. Gallinas ponedoras y reproductoras: 450 g/Ton alimento en etapas de preinicio e iniciación. Cerdos (engorde, cerdas de cría y reproductores): 450 g/Ton alimento en etapas de preinicio e iniciación. Crustáceos y peces de aguas frías y cálidas: 450 g/Ton alimento en etapas de preinicio e iniciación.	Producto para ser utilizado como parte de un programa de reemplazo de antibióticos promotores de crecimiento, además de su acción prebiótica también mejora la eficiencia alimenticia y fortalece la estructura intestinal mejorando la salud y el desempeño de los animales de su producción.	Republica Dominicana, Ecuador, Colombia y Guatemala
	Fingrow Producción			Pollos de engorde: 450 g/Ton alimento en etapas de engorde y finalización. Gallinas ponedoras y reproductoras: 450 g/Ton alimento en etapas de levante y postura/producción. Cerdos (engorde, cerdas de cría y reproductores): 450 g/Ton alimento en etapas de engorde, finalización, gestación, lactancia y reproducción. Crustáceos y peces de aguas frías y cálidas: 450 g/Ton alimento en etapas de juveniles, adultos y reproducción.	Producto para ser utilizado como parte de un programa de reemplazo de antibióticos promotores de crecimiento, además de su acción prebiótica también mejora la eficiencia alimenticia y fortalece la estructura intestinal mejorando la salud y el desempeño de los animales de su producción.	



Terresis Agriculture	pHix-up	oxido de Magnesio	Rumiantes	0,2 - 0,5% de la materia seca	fuentes de magnesio altamente soluble y buffer	Mexico, Argentina, Peru, Costa-Rica, Uruguay, Chile, Venezuela, Colombia, Brazil, Paraguay
---------------------------	---------	-------------------	-----------	-------------------------------	--	--



TABLA DE PROBIÓTICOS & OTROS



EMPRESA/
FABRICANTE

NOMBRE
COMERCIAL

INGREDIENTE/S

CONCENTRACIÓN (UFC/G PROD.)

ESPECIE DE DESTINO

DOSIS DE USO

INFORMACIÓN ADICIONAL

PAISES EN
DISTRIBUCIÓN EN
LATINOAMÉRICA

ADISSEO
A Bluestar Company

ALTERION NE

Bacillus subtilis 29784

1x10¹⁰ UFC/g prod

Producto para incorporación en premezcla que se utilizará para la producción de alimentos para pollos de engorde, pavos, reproductoras y ponedoras.

10 g/ton de alimento.

ALTERION NE 50

Bacillus subtilis 29784

2x10⁸ UFC/g prod

Producto para incorporación directa en alimentos de pollos de engorde, pavos, reproductoras y ponedoras.

500 g/ton de alimento.

1) Primer probiótico en el mercado con germinación intestinal comprobada *in vivo*
2) Probiótico resistente a la peletización y al pH gástrico con germinación precisa en el intestino de las aves.
3) Acción en la modulación de la microbiota intestinal, incluso favoreciendo el control de patógenos como *E. coli*, *Clostridium perfringens* y *Salmonella spp.*
4) Favorece la integridad intestinal y tiene una acción antiinflamatoria que promueve un mayor equilibrio de la salud intestinal, disminuye la disbiosis y proporciona mayores ganancias zootécnicas.
5) Producto con compatibilidad comprobada con los principales promotores y anticoccidianos del mercado.

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela

