



TABELA
**PREBIÓTICOS,
PROBIÓTICOS
& OUTROS**

EDIÇÃO BRASIL

2026

nutriNews
.com



EMPRESA	NOME DO PRODUTO	INGREDIENTES ATIVOS	CONCENTRAÇÃO (UFC/G PROD.)	TIPO DE USO	DOSE	INFORMAÇÃO ADICIONAL
	Colostrum® Bio 21 Líquido	Probiótico de múltiplas cepas, composto por: <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Enterococcus faecium</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus delbrueckii</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Lactobacillus reuteri</i> , <i>Lactobacillus salivarius</i> , <i>Pediococcus acidilactici</i>	<i>Bacillus subtilis</i> 1,0x10 ⁸ UFC/ml <i>Enterococcus faecium</i> 6,0x10 ⁸ UFC/ml <i>Lactobacillus acidophilus</i> 1,0x10 ⁸ UFC/ml <i>Lactobacillus delbrueckii</i> 1,0x10 ⁸ UFC/ml <i>Lactobacillus plantarum</i> 3,0x10 ⁸ UFC/ml <i>Lactobacillus reuteri</i> 5,0x10 ⁸ UFC/ml <i>Lactobacillus salivarius</i> 1,0x10 ⁸ UFC/ml <i>Pediococcus acidilactici</i> 3,0x10 ⁸ UFC/ml	Indicado para colonização precoce (incubatório) e/ou recolonização intestinal sempre que necessário (granjas) de frangos, poedeiras e aves reprodutoras.	In ovo: 10.000 ovos/frasco, aplicando o volume de 0,005 mL por ovo incubado; Via spray: reprodutoras e poedeiras 5.000 doses/frasco; frangos de corte 10.000 doses/frasco; Via água de bebida: reprodutoras, poedeiras e frangos de corte 10.000 doses/frasco.	Objetivos: controle de enterobactérias (salmonelas paratíficas e <i>E. coli</i> - APEC), <i>Clostridium perfringens</i> e ganho de desempenho. Apresentação: frascos com 50 mL.
	Colostrum® Líquido	Probiótico NAGF (<i>Normal Avian Gut Flora</i>), composto por cultura indefinida de microrganismos (CBMAI 1064).	Bactérias anaeróbicas totais 1,0x10 ⁶ UFC/ml Bactérias produtoras de ácido láctico 1,0x10 ⁶ UFC/ml	Indicado para colonização precoce (incubatório) e/ou recolonização intestinal sempre que necessário (granjas) de frangos, poedeiras e aves reprodutoras.	Via spray: reprodutoras e poedeiras 5.000 doses/frasco; frangos de corte 10.000 doses/frasco; Via água de bebida: reprodutoras e poedeiras 5.000 doses/frasco; frangos de corte 10.000 doses/frasco.	Objetivos: controle de enterobactérias (salmonelas paratíficas e <i>E. coli</i> - APEC) e ganho de desempenho, através da colonização de todos os segmentos intestinais (intestino delgado e cecos). Apresentação: frascos com 50 mL.





EMPRESA	NOME DO PRODUTO	INGREDIENTES ATIVOS	CONCENTRAÇÃO (UFC/G PROD.)	TIPO DE USO	DOSE	INFORMAÇÃO ADICIONAL
	Colostrum® Bio 21 Mix	Probiótico de múltiplas cepas, composto por: <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Enterococcus faecium</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus delbrueckii</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Lactobacillus reuteri</i> , <i>Lactobacillus salivarius</i> , <i>Pediococcus acidilactici</i> , dióxido de silício, levedura seca de cana e leite desnatado em pó.	<i>Bacillus subtilis</i> 1,0x10 ⁸ <i>Enterococcus faecium</i> 6,0x10 ⁸ <i>Lactobacillus acidophilus</i> 1,0x10 ⁸ <i>Lactobacillus delbrueckii</i> 1,0x10 ⁸ <i>Lactobacillus plantarum</i> 3,0x10 ⁸ <i>Lactobacillus reuteri</i> 5,0x10 ⁸ <i>Lactobacillus salivarius</i> 1,0x10 ⁸ <i>Pediococcus acidilactici</i> 3,0x10 ⁸	Indicado para uso em todas as fases de ração de frangos, poedeiras e aves reprodutoras.	50 a 250 g/t de ração.	Objetivos: controle de enterobactérias (salmonelas paratíficas e <i>E. coli</i> - APEC), <i>Clostridium perfringens</i> e ganho de desempenho. Apresentação: saco plástico contendo 10 kg.
	Colostrum® BS	Probiótico composto por cepa específica de <i>Bacillus subtilis</i> (LOFU-160), dióxido de silício, levedura seca de cana e leite desnatado em pó.	<i>Bacillus subtilis</i> 1,0x10 ⁸	Indicado para uso em todas as fases de ração de frangos, poedeiras e aves reprodutoras.	100 a 500 g/t de ração.	Objetivos: controle do <i>Clostridium perfringens</i> (Enterite Necrótica) e ganho de desempenho. Termorresistente: seu triplo revestimento, confere resistência ao processamento térmico de rações. Apresentação: saco plástico contendo 10 kg.
	Colostrum® Mix	Probiótico NAGF (<i>Normal Avian Gut Flora</i>), composto por cultura indefinida de microrganismos (CBMAI 1064), dióxido de silício, parede celular de levedura e leite desnatado em pó.	Bactérias anaeróbicas totais 1,0x10 ⁸ Bactérias produtoras de ácido láctico 1,0x10 ⁴ Mananoligossacarídes 370g/kg	Indicado para uso em todas as fases de ração de frangos, poedeiras e aves reprodutoras.	100 a 500 g/t de ração.	Objetivos: controle de enterobactérias (salmonelas paratíficas e <i>E. coli</i> - APEC) e ganho de desempenho, através da colonização de todos os segmentos intestinais (intestino delgado e cecos). Apresentação: saco plástico contendo 10 kg.



EMPRESA	NOME DO PRODUTO	INGREDIENTES ATIVOS	CONCENTRAÇÃO (UFC/G PROD.)	TIPO DE USO	DOSE	INFORMAÇÃO ADICIONAL
	Colostrum® BioSuis	Probiótico de múltiplas cepas, composto por: <i>Bacillus</i> sp, Bactérias Lácticas Totais, <i>Bifidobacterium lactis</i> , leite em pó desnatado e levedura inativada.	<i>Bacillus subtilis</i> 1,0 x 10 ⁶ UFC/g <i>Lactobacillus acidophilus</i> 1,0 x 10 ⁶ UFC/g <i>Lactobacillus delbrueckii</i> 1,0 x 10 ⁶ UFC/g <i>Lactobacillus salivarius</i> 1,0 x 10 ⁶ UFC/g <i>Lactobacillus plantarum</i> 1,0 x 10 ⁶ UFC/g <i>Pediococcus acidilactici</i> 1,0 x 10 ⁶ UFC/g <i>Enterococcus faecium</i> 1,0 x 10 ⁶ UFC/g <i>Lactobacillus reuteri</i> 3,0 x 10 ⁶ UFC/g <i>Bifidobacterium lactis</i> 1,0 x 10 ⁶ UFC/g <i>Bacillus lincheniformis</i> 1,0 x 10 ⁶ UFC/g	Indicado para uso da creche à terminação.	Fase de creche: 200 gramas por tonelada de ração. Fase de crescimento e terminação: 50 gramas por tonelada de ração.	Objetivos: promove a colonização intestinal com bactérias benéficas da própria espécie, com ação efetiva no controle de diarreias em leitões na fase pós-desmame, proporcionando melhor conversão alimentar, menor taxa de mortalidade e maior ganho de peso. Diferencial do produto é a presença de bactérias lácticas isoladas e selecionadas de animais de alta performance , de granjas com excelentes índices zootécnicos. Apresentação: saco plástico contendo 10 kg.
	Colostrum® Aqua	Probiótico de múltiplas cepas, composto por: <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus velezensis</i> , <i>Bacillus pumilus</i> , levedura inativada e dióxido de silício.	<i>Bacillus subtilis</i> 1,0x10 ⁸ UFC/g <i>Bacillus velezensis</i> 1,0x10 ⁸ UFC/g <i>Bacillus pumilus</i> 1,0 x10 ⁸ UFC/g	Indicado para tilápia-do-nylo em qualquer fase do ciclo produtivo.	Adicionar 100 gramas por tonelada de ração, para ser misturado em quantidade suficiente de óleo de cobertura a ser aplicado por aspersão sobre os pellets.	Desenvolvido em parceria com o Instituto de Pesca – SP, com cepas específicas de tilápia-do-nylo . Melhoria do desempenho zootécnico (ganho de peso, conversão alimentar) e eficiência de utilização de proteínas. Melhora a saúde intestinal das tilápias, reduzindo os valores de nitrogênio e fósforo no ambiente de criação, mantendo a melhor qualidade da água . Apresentação: sacos de 1 e 10 Kg.



EMPRESA	NOME DO PRODUTO	INGREDIENTES ATIVOS E OUTROS INGREDIENTE/S	COMPOSIÇÃO	TIPO DE USO	DOSE	INFORMAÇÃO ADICIONAL
NOVUS	ACTIVATE® DA Aditivo Eubiótico	Ácido benzóico, ácido fumárico e DL-metionina hidróxi análogo de cálcio	Ácido benzóico, ácido fumárico, DL-metionina hidróxi análogo de cálcio e excipientes	Aditivo zootécnico acidificado para uso na alimentação de aves, suínos e aquacultura auxiliando na melhoria do desempenho destas espécies através da promoção do equilíbrio da microbiota gastrointestinal.	Utilizar segundo a indicação do nutricionista responsável ou como sugerido a seguir: Adicionar ao alimento final na proporção de 3-5kg de produto por tonelada de ração.	Para mais informações consulte um de nossos técnicos info@novusint.com
	ACTIVATE® WD MAX Aditivo Eubiótico	Ácido fórmico, ácido propiônico e DL-metionina hidróxi análogo	Ácido fórmico, ácido propiônico, DL-metionina hidróxi análogo e excipientes	Aditivo zootécnico acidificado para uso na água de bebida de aves e suínos com efeito de melhoria do desempenho destas espécies através da promoção do equilíbrio da microbiota gastrointestinal.	Utilizar segundo a indicação do nutricionista responsável ou como sugerido a seguir: Adicionar à água de bebida na proporção de 0,04 a 0,08% para alcançar um pH final entre 3 e 4.	
	AVIMATRIX® Aditivo Eubiótico	Ácido benzóico, ácido fumárico e formiato de cálcio	Ácido benzóico, ácido fumárico, formiato de cálcio e excipientes	Aditivo zootécnico acidificado, em forma granular, produzido com a tecnologia Novus Premium Blend. Uso em avicultura.	Utilizar segundo a indicação do nutricionista responsável ou como sugerido a seguir: Adicionar ao alimento final na proporção de até 500g de produto por tonelada de ração.	
	NEXT ENHANCE® 150 Aditivo Eubiótico	Timol e carvacrol	Timol, carvacrol e excipientes	Aditivo zootécnico melhorador de desempenho, composto por óleos essenciais, para uso na alimentação de ruminantes, monogástricos e aquacultura auxiliando na melhoria do desempenho destas espécies através da promoção do equilíbrio da microbiota gastrointestinal.	Utilizar segundo a indicação do nutricionista responsável ou como sugerido a seguir: Adicionar ao alimento final na proporção de 15 a 60g de produto por tonelada de ração.	
	PROVENIA® Aditivo Eubiótico	Ácido benzóico, ácido fumárico e formiato de cálcio	Ácido benzóico, ácido fumárico, formiato de cálcio e excipientes	Aditivo zootécnico acidificado, em forma granular, produzido com a tecnologia Novus Premium Blend. Uso em suínos.	Adicionar ao alimento completo para suínos em até 0,5% ou conforme indicado abaixo: ➤ Leitões: até 0,25% ➤ Suínos em crescimento: até 0,5%	

*Produtos formulados que em sua composição contêm aditivos prebióticos e probióticos, além de outros ingredientes.





Tabela

PREBIÓTICOS, PROBIÓTICOS & OUTROS 2026

EMPRESA	NOME DO PRODUTO	INGREDIENTES ATIVOS	CONCENTRAÇÃO (UFC/G PROD.)	TIPO DE USO	DOSE	INFORMAÇÃO ADICIONAL
	Actisaf Sc47 HR+	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	(1 X 10 ¹⁰ UFC/g)	Actisaf Sc47 HR+ é uma levedura probiótica premium em forma de microesferula desenvolvida para suportar todos os fatores estressantes durante o processo de peletização	Aves: de 0,3 a 2,0 kg/tonelada de alimento completo Suínos: de 0,3 a 2,0 kg/tonelada de alimento completo Bovinos de corte e leite: de 3 a 20 g/animal/dia Caprinos e ovinos: de 3 a 20 g/animal/dia Equinos: de 3 a 20 g/animal/dia Peixes: 1kg/tonelada de ração Coelhos: de 0,5 a 0,75 kg/ tonelada de alimento completo.	ActiSaf® Sc47 HR+ é a levedura probiótica de referência obtida a partir de uma cepa única e exclusiva, denominada Sc47. Em forma de microesfera, o produto resiste às altas temperaturas do processo de peletização da ração. ActiSaf® modula a microbiota intestinal, favorece a integridade intestinal, a função digestiva, a digestibilidade dos alimentos, favorecendo assim a eficiência alimentar e o desempenho dos animais. Atua no auxílio ao controle de enterites bacterianas, na melhora da saúde ruminal, no aumento da produção de leite e de sólidos, e eleva a transferência de imunidade passiva via colostro, o que favorece o ganho de peso pelos leitões e a homogeneidade da leitegada. É a levedura viva que pode ser adicionada em rações peletizadas.
	Procreatin 7		(15 X 10 ⁹ UFC/g)	Procreatin® 7 é um aditivo probiótico com alto teor de levedura viva <i>Saccharomyces cerevisiae</i> recomendado para uso em ração não peletizada.	Monogástricos: De 0,3 a 2,0 kg por tonelada de alimento completo. Ruminantes: de 3 a 20 gramas/animal/dia.	Procreatin® 7 é a levedura probiótica (concentrado de levedura viva) amplamente utilizado na produção animal, que atua no equilíbrio da microbiota intestinal, na melhoria da eficiência alimentar, na redução de problemas de acidose, na melhora da digestibilidade do alimento, no aumento do CMS e da produção e sólidos do leite, na redução de distúrbios metabólicos na transição de dieta de bovinos e no fortalecimento do sistema imune. Para uso em ração farelada.
	pHix-up	Óxido de magnésio		Destinado a ruminantes	Adicionar de 0,2 a 0,5% da matéria seca	Fonte de magnésio altamente solúvel e com ação tamponante. Distribuído para México, Argentina, Peru, Costa Rica, Uruguai, Chile, Venezuela, Colômbia, Brasil e Paraguai

*Produtos formulados que em sua composição contêm aditivos prebióticos e probióticos, além de outros ingredientes.



EMPRESA	NOME DO PRODUTO	TIPO DE INGREDIENTE/S	COMPOSIÇÃO	TIPO DE USO	DOSE	INFORMAÇÃO ADICIONAL
	GLUCAN MOS	Betaglucanos e mananoligossacarídeos (MOS)	Betaglucanos e mananoligossacarídeos (MOS) de leveduras <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Indicado para todas as espécies	➤ Aves: 1-2 kg/ton ➤ Suínos: 1-3 kg/ton ➤ Peixes e Camarões: 1-3 kg/ton ➤ Cães e Gatos: 1-3 kg/ton ➤ Bovinos: 10-20 g/cabeça/dia	IMUNOMODULAÇÃO: Os β-glucanos 1,3 e 1,6 são imunomoduladores que estimulam a atividade das células do sistema imunológico. Eles aumentam as concentrações de anticorpos no soro e na mucosa intestinal, a síntese de antimicrobianos naturais (peróxido de hidrogênio e óxido nítrico) e a resistência ao estresse (cortisol). AGLUTINAÇÃO FÍSICA DE BACTÉRIAS NOCIVAS: O MOS é um potente aglutinador de bactérias com fímbrias do tipo I, como <i>Salmonella</i> e <i>E. coli</i>, contribuindo para o equilíbrio da microbiota intestinal. O efeito secundário da modulação da microbiota e da imunomodulação intestinal se reflete na melhora da saúde sistêmica do animal. Pode ser usado como sinérgico, substituto ou rotativo os APC's.



EMPRESA	NOME DO PRODUTO	TIPO DE INGREDIENTE/S	COMPOSIÇÃO	TIPO DE USO	DOSE	INFORMAÇÃO ADICIONAL
	BIOWALL	Betaglucanos e mananoligossacarídeos (MOS)	Parede celular de <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Indicado para todas as espécies	Adicionar à ração dos animais de acordo com a recomendação do Gerente Técnico.	BioWall é uma fração premium da parede celular de levedura, rica em polissacarídeos bioativos como B-glucanos (1,3/1,6) e mananoligossacarídeos (MOS), que atua como uma barreira biológica natural, protegendo os animais contra patógenos intestinais e desafios por micotoxinas, ao mesmo tempo em que reforça a integridade intestinal e a resiliência imunológica. - Adsorve e reduz a biodisponibilidade de micotoxinas, como Zearalenona (ZEA) e Ocratoxina A (OTA), - Impede a adesão de patógenos intestinais como <i>Salmonella</i> e <i>E. coli</i>, por meio da aglutinação promovida pelo MOS. - Estimula a resposta imune - Promove o equilíbrio da microbiota intestinal por efeito prebiótico natural.
	BIOHYDRO	Levedura <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Levedura <i>Saccharomyces cerevisiae</i> hidrolisada	Indicado para todas as espécies	- Aves - Frangos de corte: 1,0 a 2,0 kg; - Suínos - Leitões desmamados - como substituto de plasma: 2,0 a 5,0%; - Suínos - Outras fases - como substituto de plasma: 1,0 a 2,0%; - Suínos - Como aditivo: 2,0 a 5,0 kg; - Bovinos - Engorda: 5 a 10 g/cabeça/dia; - Bovinos - Vacas leiteiras - pré e pós-parto: 10 a 20 g/cabeça/dia; - Peixes e camarões: 0,5 a 4,0%	Compostos de baixo peso molecular. Por meio de uma hidrólise enzimática cuidadosamente controlada, as proteínas são transformadas em peptídeos, aminoácidos e nucleotídeos livres de baixo peso molecular, altamente biodisponíveis, garantindo elevada digestibilidade e melhor absorção dos nutrientes. Suporte a saúde intestinal e a imunidade: Rico em B-glucanos e MOS que modulam a imunidade e equilibram a microbiota. Estimula o desenvolvimento e a adaptação: Ideal para animais jovens, idosos ou estressados (desmame, transporte, recuperação de saúde) onde o uso eficiente de energia e nutrientes são essenciais. Realçador natural de sabor: Aumenta a palatabilidade e reduz rejeição da ração.



EMPRESA	NOME DO PRODUTO	TIPO DE INGREDIENTE/S	COMPOSIÇÃO	TIPO DE USO	DOSE	INFORMAÇÃO ADICIONAL
	GOLF	Mananoligossacarídeos (MOS), betaglucanos, galactoligossacarídeos, fructoligossacarídeos	Mananoligossacarídeos (MOS), betaglucanos, galactoligossacarídeos, fructoligossacarídeos e levedura	Indicado para todas as espécies	▶ Aves: 1- 2kg/ton ▶ Suínos: 1- 3kg/ton ▶ Bovinos: 5 - 20g/cabeça/dia ▶ Cães e gatos: 1 - 3kg/ton ▶ Aquacultura: 2 - 4kg/ton	O GOLF é um blend de prebióticos naturais, de tecnologia exclusiva da OLMIX, especialmente desenvolvidos para aumentar dezenas de vezes as populações de bactérias benéficas (principalmente <i>Lactobacillus</i> e <i>Bifidobacterias</i>) e reduzir a população de microrganismos patogênicos, como <i>Salmonella</i>, <i>E. coli</i>, o <i>Clostridium</i>, e outros patógenos oportunistas devido a sinergia de seus componentes (FOS, GOS, MOS e beta-glucanos), que atuam modulando a microbiota intestinal e, por conseguinte promovem a saúde intestinal e sistêmica do animal. EFEITO BIFIDOGÊNICO: Os prebióticos FOS e GOS são fibras fermentáveis solúveis, que, por não serem digeridas pelas enzimas digestivas do animal, chegam ao intestino grosso, onde servem como substratos para bactérias benéficas, aumentando a síntese de ácidos graxos de cadeia curta (acético, propiônico e butírico) e Bacteriocinas. SAÚDE INTESTINAL: Com o aumento da população de bactérias benéficas, o crescimento de microrganismos patogênicos é inibido por diferentes meios de ação, sendo estes a exclusão competitiva, acidificação do meio intestinal, ação direta de bacteriocinas e ácidos graxos. A redução da enterite e a acidificação do pH intestinal favorecem a ação das enzimas digestivas, resultando em uma melhora na absorção de nutrientes da dieta, incluindo minerais como cálcio e magnésio. AGLUTINAÇÃO FÍSICA DE BACTÉRIAS NOCIVAS: MOS é um poderoso aglutinador de bactérias que possuem fímbrias do tipo I, como <i>Salmonella</i> e <i>E. coli</i>. A sinergia entre seus princípios ativos faz do GOLF uma mistura prebiótica com alta capacidade de modular a microbiota de animais com efeito imunomodulador efetivo, aumentando o desempenho produtivo e melhorando o estado de saúde dos animais.

